

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Bonn.
(Direktor: Prof. Dr. Martini)
und der
Heilstätte Rheinland (Chefarzt: Dr. Schulte-Tigges.)

Die Calciumtherapie bei der Lungentuberkulose.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung

der

D o k t o r w ü r d e

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn.

Vorgelegt am 14. November 1936

von

Karl Vieweger

aus Bonn.



BONN 1937

Buchdruckerei Kubens Nachf., Inh.: H. Schnitzler, Maxstr, 75

Gedruckt mit Genehmigung
der med. Fakultät der Universität Bonn.
Referent : Prof. Dr. Martini.



Alle Lebewesen bedürfen zum Leben bestimmter Ionen wie Kalzium, Kalium und Natrium. In allen Nährflüssigkeiten für tierische Gewebe müssen sie in einer bestimmten Konzentration vorhanden sein. Der Einfluß dieser Ionen auf die Zelle ist verschieden und zwar so, daß sie bestimmte Lebensäußerungen in positivem oder negativem Sinne beeinflussen. Es hat sich durch viele experimentelle Untersuchungen als Regel ergeben, daß, wenn Kalzium eine bestimmte Funktion fördert, dieselbe durch Kalium gehemmt wird und umgekehrt. Daß also Kalzium und Kalium in ihrer Wirkung auf Lebensvorgänge Antagonisten sind. Die Stellung des Natriums in dieser antagonistischen Wechselbeziehung ist bisher weniger klar. Durch diese antagonistische Wirkung steuern sie gleichsam die Lebensvorgänge in die zum Fortbestand der Zelle zweckmäßigste Bahn. Sie müssen also, wenn der Organismus existieren soll, in einem bestimmten Mengen- und dadurch Wirkungsverhältnis gegeneinander genau abgestuft sein. Eine Veränderung in der Konzentration eines dieser Ionen muß eine Störung im Lebensablauf bewirken, falls sie nicht durch eine entsprechende Mitveränderung der antagonistischen Ionen kompensiert wird (K r a u s und Z o n d e c k). So kann z. B. ein aus dem Organismus entnommenes Herz nur solange normal weiter schlagen, als es mit einer Flüssigkeit durchspült wird, in der nicht nur der osmotische Druck durch NaCl in physiologischer Konzentration, sondern außerdem Kalzium und Kalium vorhanden sind. Fügt man dieser Lösung etwas zuviel Kalium zu, so wird die Herztätigkeit allmählich schwächer bis zum diastolischen Stillstand, steigert man daraufhin auch die Kalziumkonzentration, so kann die normale Tätigkeit wieder eintreten (W i e c h m a n), war aber die zugefügte Kaliummenge zu groß, dann tritt nach einer überstarken Herztätigkeit krampfhaft systolischer Herzstillstand ein. Ähnlich ist die Wirkung dieser beiden Ionen auf allen glatten Muskeln des Körpers, wo Kalium immer im Sinne des Parasympatikus und Kalzium in dem des Sympatikus wirkt. Bei Leukozyten bewirkt Kalzium eine Förderung und Kalium eine Herabsetzung der Phagozytose. Für die pathologische Physiologie ist es besonders wichtig, daß Kalzium die Kittsubstanz zwischen den Endothelien der Gefäße abdichtet (R o s e n o w, S t a r k e n s t e i n), wodurch der Übertritt von Flüssigkeit vom Blut ins Gewebe eingeschränkt wird (H e r b s t). Ferner, daß die Blutgerinnung nur bei Anwesenheit von Kalziumionen zustande kommt und durch einen Überschuß von diesen gefördert wird (W h r i g t, H a m m a r s t e n). Billigheimer, Stubel, Kaewel und Morawitz

sehen die blutstillende Wirkung des Kalziums in der Wirkung der hypertoniſchen Lösung. Eine ſtärkere Senkung des Blutkalziumſpiegels, wie ſie bei Unterfunktion der Parathyreoidea zuſtande kommt, führt zur geſteigerten Erregbarkeit des Zentralnervensystems, wodurch eine beruhigende Wirkung des Kalziums auf dieſes hervorgeht. Auf eine Störung im Kalziumſtoffwechſel, die durch Fehlen von Vitamin D entſteht, beruht die Rachitis. Dies weiſt außerdem auf eine Beziehung zwiſchen Vitamin D und Kalziumſtoffwechſel hin. Eine einheitliche Erklärung für dieſe Ionenwirkung gibt es noch nicht. Kraus und Zondeck zeigen in ihren Verſuchen, daß die zellmembranverdichtende Wirkung des Kalziums darauf beruht, daß ein Kalziumüberſchuß eine Verdrängung von H-Ionen bewirkt, wodurch der Quellungsdruck von Eiweißen geſenkt wird und die membranabdichtende Wirkung erfolgt. Am Tierexperiment konnten Chiarrì und Januſchke zeigen, daß durch intravenöſe und ſubkutane Gaben von Kalziumchlorid eine durch Senföl zu erzeugende Konjunktivitis verhindert werden kann. Gold gelang es durch prophylaktiſche Verabreichung von Kalziumchlorid und Rothlin durch Verabreichung von glukonſaurem Kalzium eine durch Kupferſulfat erzeugte Pleuritis exſudativa zu hemmen oder zu unterdrücken. Lehner ſtellte bei Menſchen die entzündungshemmende Wirkung des Kalziums feſt, indem er durch intrakutane Injektion von Atropin Urticariaquaddeln erzeugte. Bei Vorbehandlung mit Kalziumchlorid trat eine Verminderung der Quaddelgröße ein. Whright beobachtete die Heilung von Urticaria nach Tetanus- und Diphtherieantitoxininjektion durch Kalkſalze.

Da es nun ſehr viele Krankheitsbilder gibt, die mit einer Veränderung der Blutgerinnbarkeit, der Lymphbildung, der Phagozytoſetätigkeit einhergehen, iſt es leicht verſtändlich, daß Kalzium ſchon lange Zeit in die Therapie eingeführt iſt. Es wurde dann auch mit mehr oder weniger großem Erfolge bei beſtimmten Formen der Haemophilie, bei Tetanie und Rachitis verwandt. Es iſt weiter leicht verſtändlich, Kalzium bei Herzkrankheiten, Hyperhydrotis, Achylie, Diarrhoe, Aſthma bronchiale oder bei Entzündungen aller Art zu verabreichen. Die Heilerfolge waren hierbei meiſt weniger eindeutig. Da nun Lungentuberkuloſe mit geſteigerter Exſudation, mit geſteigerter Schweißabſonderung (Eppinger, Hoffmann) und Blutungen einhergehen kann, und da der Tuberkuloſe hypernormale Mengen Kalk abſcheiden ſoll (Senator), lag es nahe, das Kalzium auch in die Tuberkuloſetherapie einzuführen.

Bei einer so chronischen und so zu Spontanheilung und Rezidiven neigenden Erkrankung wie die Lungen-Tbc. ist es oft außerordentlich schwer, bei einer durch spezifische Therapie erreichten Besserung eine Spontanbesserung auszuschließen, und sie nur auf die Wirkung des angewandten Mittels zurückzuführen. Es müssen deshalb die Kriterien der Beurteilung einer Besserung hierbei besonders streng beobachtet werden.

Martini schlug deshalb vor, nur solche Fälle für die Beurteilung eines therapeutischen Erfolges oder Mißerfolges zu berücksichtigen, die auf der Grundlage des Vergleiches aufgebaut sind. Die Wirkung oder das Versagen einer therapeutischen Handlung soll bewertet werden, indem der unter dem Einfluß der Therapie stehende Krankheitsverlauf, die Krankheitsdauer oder der Krankheitsausgang verglichen wird mit dem spontanen Verlaufe, der spontanen Dauer und dem spontanen Ausgang ähnlicher Fälle. Unerläßliche Voraussetzung ist also die genügende Kenntnis des Spontanverlaufs, die durch genügend lange Beobachtung der gleichen Kranken erst ohne jede spezifische Therapie dann während und nach Möglichkeit nach derselben. Voraussetzung dafür ist, daß die Vorbeobachtungsperiode wenigstens genügend lange Zeit ist und einen ruhigen und gleichmäßig kontinuierlichen Verlauf zeigt. Diese Verläufe der Erkrankung vor dem Einsetzen der spezifischen Therapie und während derselben können nur dann genügend untereinander verglichen werden, wenn genügend Kriterien existieren, an Hand derer sie verfolgt werden können. An solchen Kriterien stehen uns zur Verfügung: Die fortlaufende Verfolgung des Allgemeinzustandes, der örtliche Lungenprozeß und seine Tendenz zum Fortschreiten oder Zurückbildung mit Hilfe von Perkussion, Auskultation und Röntgenuntersuchung; ferner das evtl. Verschwinden der Tuberkelbazillen im Auswurf, die Auswurfmenge, Puls, Atemfrequenz; schließlich Metastasierungen bzw. Komplikationen durch Organtuberkulose. Die meisten der hier genannten Kriterien erlangen ihre Bedeutung erst im Vergleich und im Zusammenhang mit anderen. Weiter kann der kausale Zusammenhang zwischen einer Heilmethode und einer Änderung im Krankheitsverlauf nur dann bejaht werden, wenn bei einer großen Anzahl gleichgerichteter Fälle nicht immer, wohl aber im Durchschnitt der Fälle die gleiche Wirkung bzw. Richtungsänderung erkennbar wird. Komplikationen aber machen jede Prüfung illusorisch. Um die Fehlerquellen des Zufalls auszuschalten, muß man eine genügend große Anzahl homogenen Materials haben. Wegen der großen Unterschiedlichkeit ist die tatsächliche Homogenität der Fälle bei

der Lungentuberkulose mehr als irgendwo sonst nur dann gewährleistet, wenn auch die Beurteilung selbst eine einheitliche ist, insofern, als sie nach einheitlichen Richtlinien durchgeführt wird.

Es wurde nun versucht, die bisher in der Literatur veröffentlichten Fälle von Kalziumbehandlung bei Tuberkulose einer Prüfung an Hand dieser Grundsätze zu unterziehen, um auf diese Weise eine Klärung zu erzielen.

Castellvi hat 12 Lungentuberkulose einer Behandlung mit Kalksalzen unterworfen bei der gewöhnlichen Krankenhauskosten. Er fand dabei günstige Wirkung auf Temperatur, auf Tachycardie, dazu Zunahme des Gewichtes und Verminderung des Hustens und des Auswurfes und Besserung des Auscultationsbefundes. Verfasser hat in seiner Arbeit zu wenig Fälle benutzt und bei seinen Fällen die Kriterien zu ungenau angegeben, um zu einem verwertbaren Resultate gelangen zu können.

Maendl fand bei 82 Fällen von Tuberkulose nach intravenöser Kalziumtherapie bei der Mehrzahl günstigen Einfluß auf das Allgemeinbefinden. Bei einigen Fällen dazu Abnahme der Sputummenge und Schwinden des Nachtschweißes. In allen Fällen wurde der Auswurf lockerer, dagegen nur in wenigen Fällen deutliche Fieberbeeinflussung. Diese Arbeit ist deshalb nicht verwertbar, weil keine Vorbeobachtung, keine Angabe des Röntgenbefundes und keine Mitteilung des Blutbefundes vorliegt, außerdem hätten die günstig beeinflussten Fälle der Zahl nach angegeben werden müssen.

In einer anderen Arbeit beobachtete er den Einfluß der intravenösen Kalkbehandlung auf die Symptome und den Verlauf der Lungentuberkulose. In den meisten der 250 Fälle wurde Abhusten leichter, der Auswurf lichter und wenig eitriger, die Nachtschweiß und Kurzatmigkeit ließen nach. Dazu fiel bei manchen Fällen die Temperatur auf normale Werte. Auch in dieser Arbeit sind die Angaben über Vorbeobachtung, Röntgenuntersuchung vor, während und nach der Behandlung, weiter die Zahl der beeinflussten Fälle, sowie die zur Beurteilung der Besserung herangezogenen Kriterien zu lückenhaft, um verwendet zu werden.

Hartwich berichtet über sehr gute Erfolge bei 600 Patienten, die an verschiedener Art und verschiedenen Stadien der Tuberkulose litten und im Lyfter-Sanatorium mit einer Kalkmixture behandelt wurden. Der Katarrh über der Lunge wurde gebessert bis aufgehoben. Die Auswurfmenge wurde weniger und das Exsudat in den meisten Fällen resorbiert. Auch hier fehlt wieder eine genügend lange Vorbeobachtung sowie Angabe über den genauen Be-

fund vor, während und nach der Behandlung, weswegen auch hier dem verwendeten Mittel kein therapeutischer Erfolg zugesprochen werden braucht.

Rosen berichtet über Erfolge einer sechswöchentlichen Infusionskur von 1,5% Kalziumchloridlösung intravenös, bei der Entfieberung, Gewichtszunahme, Schwinden von Nachtschweiß und Besserung von Husten und Auswurf gesehen wurde. Hier wird wieder die Zahl der beobachteten Krankheitsfälle, sowie genaue Daten aus der Krankengeschichte über Vorbeobachtung, gleichzeitig angewandte andere therapeutische Maßnahmen, sowie genügend exakte Kriterien einer Besserung verschwiegen, sodaß auch diese Arbeit nicht von dem Erfolge der Kalziumtherapie überzeugen kann.

Pinkhof beobachtete 100 Lungenkranke im Amsterdamer Krankenhaus unter intravenöser Kalkbehandlung. Bei 60% seiner Fälle konnte er einen Erfolg in Bezug auf Temperatur und Auswurf feststellen, zuweilen auch subjektive Besserung. Hier also nur Besserung einiger Symptome und kein Erfolg des Grundleidens. Bei seinen Fällen fehlen die Angaben über Vor- und Nachbeobachtungszeit. Die einzelnen Kriterien wie Röntgenbefund, Auskultationsbefund, Blutbefund sind auch nur spärlich wiedergegeben. Die wenigen günstigen Symptome können auch schon durch die Ruhekur allein eingetreten sein.

Hein beobachtete 218 fast ausnahmslos schwere Fälle von Lungentuberkulose mit Kavernenbildung von vorwiegend exsudativem Charakter. Er stellte Untersuchung bei peroraler, intramuskulärer und intravenöser Kalkapplikation an. Er erreichte eine gewisse Konstanz des Blutkalkspiegels und stellte Temperaturabfall fest, der nach meiner Meinung nicht sicher zu werten ist, da eben so viele negativ verliefen. Er hatte guten Effekt gegen Nachtschweiß und gute Beeinflussung der Sputummenge. Da leider auch hier die Angaben über Vor- und Nachbeobachtungszeit fehlen und die Kriterien der Untersuchung zu ungenau angegeben sind, kann auf Grund des vorliegenden Materials nicht entschieden werden, ob eine direkte Beeinflussung des Tbc.-Prozesses durch die Kalktherapie erzielt worden ist.

Ostroumova beobachtete 117 Fälle, denen er Kalziumchlorid intravenös injizierte. Er nahm tuberkulöse Prozesse mit vorwiegend perifokalen Reaktionen mit geringer Ausbreitung und wenig Aktivität. Es fehlen in dieser Arbeit überhaupt genauere Angaben über Krankengeschichte, Kriterien usw. Zudem stellte er nur bei 20 Fällen eine subjektive und nur bei 4 Fällen eine objek-

tive Besserung fest, wodurch auch diese Arbeit für die Bewertung des Kalziums hinfällig wird.

U n d r i t z gab bei verschiedensten Formen der Lungentuberkulose mit Ausnahme akuter und hochaktiver Fälle intramuskulär Kalziumglukonat „Sandoz“. Von den 60 Fällen waren 11 nur einwandfrei gebessert (Temperatur, Sputummenge, Senkung, Gewicht und klinischer Befund). 50% der Fälle sind gleich nach der Aufnahme mit Kalk behandelt worden, können also, weil die Vorbeobachtungszeit fehlt, nicht bewertet werden. Bei 5% der Fälle wurde außerdem eine andere Therapie dazu betrieben. 15% seiner Fälle besserten sich schon in der Vorbeobachtungszeit, und bei 5% wurde die Kur vorzeitig abgebrochen. Es ist also auch hier kein verwertbares Ergebnis der Behandlung der Lungentuberkulose mit Kalzium erzielt worden.

S t e r n b e r g berichtet über heilsame Wirkung der Kalkzufuhr in allen Stadien der Lungentuberkulose. „Die biologische Wirkungsweise des Kalziums äußert sich in einer Aktivierung zahlreicher Fermente, in einer anregenden Wirkung auf das weiße Blutbild und einer allgemein antitoxischen Wirkung.“ Er benützte zu seinen Versuchen das Kalzium-Hormon-Ferment-Kombinationspräparat Vitacalcin. Dieses intravenös gegeben bewirkte nicht nur symptomatische Besserung der Hauptbeschwerden (Fieber, Nachtschweiß, Appetitlosigkeit), sondern auch auf die Bösartigkeit und Progredienz des Prozesses im wesentlichen Ausmaße wirkte es günstig. Aus den kurzen Angaben über Krankengeschichten und Kriterien ist zu schließen, daß Verfasser Röntgenbefund und Blutbefund sowie Nachbeobachtungszeit unterlassen hat, ferner fehlt die Angabe der Zahl der untersuchten Fälle. Dann verwandte er ein Kombinationspräparat, wodurch man nicht feststellen kann, in wie weit dem Kalzium der Erfolg zuzuschreiben ist, außerdem sind die Kriterien der Besserung zu ungenau.

In einer anderen Arbeit geht aus seinen Darlegungen hervor, „daß bei der Kalziumtherapie der Tuberkulose das erste Bestreben darauf gerichtet sein muß, den Blutkalk wieder auf den normalen Wert zu bringen“. Dies erreichte er durch kombinierte intravenöse und perorale Darreichung von Kalzium „Sandoz“. Aus seinem Material aus 100 Fällen geht hervor, daß die geschilderte Form der Kalkverabreichung geeignet ist, umstimmend auf die Progredienz des Tbc.-Prozesses zu wirken, die Vernarbungstendenz zu steigern und die Krankheitsdauer abzukürzen. Seine vier wiedergegebenen Krankengeschichten sind gut geführt, lassen aber erkennen, daß Verfasser Vorbeobachtungs- und Nachbeobachtungszeit unterlassen

hat, womit auch durch diese Arbeit kein eindeutiger Beweis des Erfolges der Kalktherapie erbracht ist.

Leitner beobachtete 22 Fälle von Tuberkulose, die er mit Kalzium „Sandoz“ intramuskulär behandelte. Er sah bei 16 seiner Fälle Besserung. Leitner gab zum Kalzium noch vitaminreiche Kost oder künstliches Vitamin. Man kann demnach nicht feststellen, ob die Besserung durch Kalk oder durch Vitamin verursacht ist. Zudem sind die Angaben der Kriterien zu gering, als daß sich die Arbeit verwerten ließe.

Mattausch untersuchte das Kalzium „Eger“ bei 86 Patienten mit frischeren und älteren Apizitiden oder nicht zu schweren Lungenprozessen, zum Teil mit Begleit- oder Emphysembronchitiden. Er gab das Präparat peroral und parenteral. Er sah eine deutliche Umstimmung im Gesamtorganismus, besonders bezüglich der vegetativen Reaktionslage, und im Nachlassen der toxischen Störungen und der Sekretionsverminderung einen wesentlichen Teilerfolg. In dieser Arbeit fehlen wieder genaue Mitteilungen über Beobachtung vor, während und nach der Kur sowie exakte, objektive Kriterien über die Beeinflussung der Tuberkulose durch Kalzium.

Kenner behandelt 260 Phthisiker mit Kalzium „Sandoz“, er erreichte einen schnelleren Abfall der erhöhten Senkung, Sinken der Temperatur und Besserung des Allgemeinbefindens. In dieser Arbeit fehlen die genaueren Angaben über Krankengeschichte, Beobachtungszeit usw., wodurch diese Arbeit für die Bewertung des Kalziums hinfällig wird.

Prest will durch Kalkgaben bei der Tuberkulose Sinken der erhöhten Temperatur und Aufhören des Nachtschweißes erreicht haben. Hier fehlen überhaupt die näheren Angaben.

Es ist leicht zu ersehen, daß in keiner der zitierten Arbeiten die günstige respektive ungünstige Beeinflussung der Lungentuberkulose durch Kalzium mit einer genügend strengen Kritik durchgeführt wurde. Keine Arbeit überzeugt davon, daß nicht viele angebliche Teilerfolge, für die das Kalzium verantwortlich gemacht wurde, auch ohne Kalzium eingetreten wären. Ganz abgesehen davon, daß sicher sehr viele Heilerfolge schon dann als solche angesprochen wurden, wenn sich einige Krankheits Symptome änderten, ohne daß eine objektive Veränderung des Lungenbefundes vorhanden war.

Als nächstes soll nun an Hand der Literatur untersucht werden, inwieweit sich durch eine Kalziumzufuhr der Blutkalkspiegel verändern läßt.

Dirr stellte bei Verabreichung von glyzerinaurem und glukonsaurem Kalzium eine Erhöhung der Blutkalziumwerte fest, bei intravenöser Injektion drei Stunden, bei intramuskulärer Injektion etwa zehn Stunden anhaltend. Bei peroraler Zufuhr brauchte er bedeutend größere Mengen. Die Zahl der Untersuchungen wird nicht mitgeteilt.

Crohn und Pröller, die ebenfalls mit glyzerinaurem Kalzium Versuche anstellten, kamen zu demselben Ergebnis. Über die Zahl der Fälle wird auch hier nichts berichtet. Bauke hatte dieselben Resultate.

Voorhoeven hat bei täglicher Verabreichung von 15 g Kalzium lactis in 50 Tagen eine Speicherung von 50 g Kalzium herbeigeführt.

Hoesch verabreichte Kalzium intravenös und fand eine Steigerung der Blutkalziumwerte, die bis zu zehn Stunden nachweisbar blieb.

Matz erreichte durch perorale Zufuhr anorganischer Kalziumsalze ein Anwachsen des Blutkalkspiegels kurz hinterher.

Zimmermann erreichte bei drei Fällen durch drei wöchentliche perorale Zufuhr von Calzan keine Veränderung des Blutkalkspiegels.

Bauke und Fricke gaben neben dem „Calcinol“ noch „Vigantol“ und fanden dabei, daß schon durch kleine Vigantolzugaben die Dauer der Kalkspiegelerhöhung wesentlich verlängert wurde, ohne aber eine nennenswerte Kalkerhöhung zu erzielen.

Einige Forscher versuchten nun durch alleinige Vigantolverabreichung den Blutkalziumspiegel zu beeinflussen.

So will Goldberg in seinen Versuchen durch Vitamin D Gaben eine Hypercalcaemie erreicht haben.

Kaminski und Davidson bewirkten nach oraler Darreichung von bestrahltem Ergosterin einige Zeitlang Hypercalcaemie. Hier fehlen wieder die näheren Angaben.

Kraitmaier, Hintzelmann und Wentzel erreichten durch Überdosierung von Vigantol abnorm starke Kalziumablagerung in der Gefäßwand in verschiedenen Organen und zwar im normalen Gewebe.

Da nun das Blut bestrebt ist seine Zusammensetzung möglichst konstant zu erhalten, ist von vornherein kaum zu erwarten, daß durch Kalziumapplikation in irgendeiner Form stärkere Änderungen des Blutkalziumwertes für längere Zeit entstehen können. Es wäre allerdings falsch anzunehmen, daß, wenn der Blutkalzium-

spiegel sich durch Kalziumverabreichung nicht für längere Zeit steigern läßt, auch der Kalziumgehalt der Gewebsflüssigkeit unbeeinflusst bleibt. Man hat sich vielmehr vorgestellt, daß nach parenteraler Verabreichung von Kalzium dieses schnell aus dem Blut entfernt wird und ans Gewebe (Vorniere) abgegeben wird und von dort ganz allmählich und ohne den Blutkalziumspiegel wieder deutlich zu erhöhen ins Blut zurückdiffundiert, um dann erst durch die Niere aus dem Körper entfernt zu werden. Da für die pharmakologische Wirkung des Kalziums aber weniger das im Blut vorhandene als vielmehr das in dem die Zelle direkt umspülenden Gewebswasser vorhandene eine Rolle spielt, sind die zitierten Arbeiten, die ja nur über den Blutkalziumspiegel berichten, für die therapeutische Wirkungsmöglichkeit von nicht allzu großer Bedeutung. Man könnte dem entgegenhalten, daß trotzdem nach Kalziumzufuhr für längere Zeit eine geringe Steigerung der Blutkalziumwerte beobachtet werden müßte, dies wird aber dadurch unmöglich, daß der normale Kalziumspiegel wie auch die Bestimmungsmethode geringen Schwankungen unterlegen sind. Daß nach einer intramuskulären Injektion einer konzentrierten Kalziumlösung der Blutkalkspiegel länger nachweisbar gesteigert bleibt als nach einer intravenösen, ist selbstverständlich. Im ersteren Falle diffundiert das Kalzium allmählich, vom Ort der Injektion, also aus der Muskulatur ins Blut und wird dann von diesem an die übrigen Körpergewebe verteilt, während nach intravenöser Injektion, bei der das Blut plötzlich mit Kalzium überschwemmt wird, dieses schon nach sehr kurzer Zeit ins Gewebe abgegeben wird. Eine intravenöse Tropfinjektion würde zum selben Resultat führen, wie eine momentane intramuskuläre Injektion. Es wäre also unstatthaft aus der Tatsache, daß nach parenteraler Zufuhr von Kalzium der Blutkalkwert nur kurze Zeit gesteigert bleibt, dem Kalzium die therapeutische Wirkungsmöglichkeit abstreiten zu wollen. Ebenso falsch würde es sein, ein Kalkpräparat, dessen Zufuhr eine länger dauernde Erhöhung des Blutkalziumspiegels erzeugt, deshalb als therapeutisch wertvoller anzusehen. Würde allerdings bei einwandfreier Bestimmungsmethodik auch nur eine ganz vorübergehende Erhöhung im Gewebskalziumgehalt erzielt, so würde dadurch die Wirkungsmöglichkeit des Kalziums weniger fraglich. Dies ist aber bisher, soweit ich die Literatur überblicken kann, nicht untersucht. Dies ließe sich experimentell nur so entscheiden, daß die Menge des insgesamt zugeführten Kalziums zur Menge des insgesamt ausgeschiedenen Kalziums bestimmt würde (Brumann). Aber auch bei diesem Bilanzversuche bleibt unbestimmt, wieviel

des zugeführten Kalziums in aktiver — wahrscheinlich ionisierter — Form und wieviel Kalzium in einer wirkungslosen Form z. B. im Knochen deponiert zurückbehalten wird. Als eindeutigste Methode käme also nur die Bestimmung des Gewebekalziumgehaltes in Frage. Wenn bei Kalzium-Vigantolverabreichung eine länger dauernde Hypercalcaemie erzielt wird, so ist das so zu erklären, daß durch Vitamin D das Kalzium mobilisiert wird und leichter ins Blut zurückdiffundiert, respektive weniger leicht ins Gewebe reponiert wird. Diese Vorstellung wird bestätigt durch die Tatsache, daß durch alleinige Zufuhr von Vitamin D auch eine Hypercalcaemie entstehen kann. Nach dieser Vorstellung müßte also das im Körper enthaltene Kalzium sowie das zugeführte therapeutische durch Vigantol an Wirkung verlieren. (Die bisherigen Ergebnisse sprechen eindeutig für eine regulierende steuernde Funktion des Vigantols auf den Kalziumstoffwechsel, dessen physiologische Bedeutung zwar noch nicht vollständig geklärt ist.)

Es wurde nun an eigenen Experimenten versucht, welche therapeutischen Erfolge bei der Tbc. mit Kalzium zu erzielen sind, und inwieweit diese Erfolge mit der Veränderung des Blutkalziumspiegels parallel gehen.

Um zu einem klaren Ergebnis zu kommen ging ich in meiner Versuchsanordnung folgendermaßen vor:

1. Bei jedem mit Kalk behandelten und untersuchten Fall wurden die Blutkalziumwerte vorher und nachher bestimmt.
2. Den Krankheitsverlauf nach Kalziumapplikation nur dann beurteilt, wenn eine genügend lange Vorbeobachtung bestanden hatte und die erzielte Erfolge nur nach einer längeren Nachuntersuchung bewertet. Dazu habe ich sämtliche Kriterien der Tuberkulose öfters kontrolliert.

Es kamen 36 Fälle, die für eine aktive, chirurgische Behandlung nicht geeignet waren, zur Untersuchung. 29 Fälle schwerer, offener, kaverner Lungentuberkulose wurden behandelt und beobachtet in Hohen-Honnef, 7 Fälle in der Bonner Medizinischen Klinik. Die Bestimmung der Kalziumwerte geschah ebendasselbst nach Kramer-Tisdall. Außer hygienisch-diätischer Behandlung kamen andere Behandlungsmaßnahmen nicht in Anwendung.

Fall 1) M. N.

1921 Verbrennung 2. Grades an Händen, Füßen und Leib. Winter 1933 Heiserkeit 14 Tage lang. Ende Januar 1934 plötzlich mit Frösteln, Müdigkeit und Fieber erkrankt, 6 Wochen lang. Im April Blut im Auswurf, Husten und Nachtschweiß.

Vorbeobachtung v. 26. 6. bis 24. 7. 1934: Lungenbefund: Über ganzer r. Seite Schallverkürzung, über oberem Lungenabschnitt gemischt-rauhes Atmen mit zähfeuchtem Katarrh. Über der unt. Lunge Atmung rau und scharf. L. geringe Spitzenschallverkürzung m. gemischt-rauhem Atmen. Über den übrigen Abschnitten Atmung rau u. scharf. 20. 7. fast kein Katarrh mehr. Beschwerden: Wenig Husten, zeitweise Brustschmerzen, müde, schlapp, geringe Eßlust. 20. 7. Husten nachgelassen, klagt über saures Aufstoßen. Auswurf: Wenig, 20. 7. 10—15 ccm; Tbc.-Baz.: 27. 6. + 2; 23. 7. + 3. Blut: BKS. 27. 6. + 12; 10. 7. + 10; 17. 7. + 7, 24. 7. + 8. Temp.: Anfangs subfebril, wurde dann normal. Gewicht: 27. 6. 68,4; 17. 7. 69,7 kg. Blutkalziumspiegel: 10. 7. 11,6 mg%; 24. 7. 11,5 mg%. Röntgenologisch: Kn. confl. cav. Tbc. R. L. Infiltrat infraclav., verwachsen confl. Fleckschatten im U-feld neben Herzspitze. R. im O-Feld schärfer begrenzte Fleckschatten, desgleichen l. verstreut in fämlichen Feldern.

Versuchsz. bis 24. 8.: Lungenbefund: 9. 8. spärlicher Katarrh Beschwerden: 9. 8. subjektiv leidlich, noch Magen säurebeschwerden, wenig Husten. Auswurf: 9. 8. 5—10 ccm. Tbc.-Baz.: 20. 8. + 2. Blut: —. Temp.: normal. Gewicht: 31. 7. 71,6 kg; 14. 8. 72,3 kg. Blutkalziumspiegel —.

Nachb. bis 25. 9.: Lungenbefund: 29. 8. wenig Katarrh, 18. 9. Katarrh stärker, 26. 9. leichter Katarrh. Beschwerden: 29. 8. morgent. Erbrechen, kein Husten, 18. 9. Husten, Nachtschweiß, Magenbeschwerden. 20. 9. dazu Rippen schmerzen. Auswurf: 29. 8. 8—10 ccm, 26. 9. 8 bis 10 ccm. Tbc.-Baz.: 14. 9. + 2. Blut: 24. 9. + 8. Temp.: normal. Gewicht: 28. 8. 74,1 kg; 24. 9. 74,4 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 8. 11,1 mg%.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal tägl. einen Teelöffel Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um eine knotige kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit ging der Katarrh etwas zurück, der Husten ließ nach, die anfangs subfebrile Temperatur ging auf normale Werte zurück. Der Auswurf wurde weniger, die erhöhte Senkung normal, dazu leichte Gewichtszunahme.

In der Versuchszeit keine wesentliche Veränderung des Befundes. Der Blutkalkspiegel blieb unbeeinflusst.

In der Nachbeobachtungszeit keine wesentliche Änderung der Befunde.

Im Ganzen wurde eine Einwirkung der Kalziumtherapie weder auf Art und Stärke des Lungenbefundes noch auf den Kalziumspiegel im Blut beobachtet. Der Versuch kann also als negativ gewertet werden.

Fall 2) F. St.

Eine Schwester an Lungen-Tbc. gestorben. Vor zwei Jahren zweimal Grippe gehabt. Okt. bis Dez. 1933 Magenulcusbehand-

lung Febr. 1934 Lungentbc. festgestellt, er selbst klagt über Huften mit wenig Auswurf und Nachtschweiß.

Vorbeobachtung v. 7. 6.—18. 7.: Lungenbefund: Bds. über dem ob. Lungengipfel verk. Klopfeschall, unbest. Atmen und mittelfeuchte Rg, bef. l. Über den übrigen Lungenabschnitten l. v. abgeschwächtes rauhes, h. unbest. Atmen, r. v. u. h. rauhes und scharfes Atmen. 28. 6. status idem. Beschwerden: Etwas Huften mit wenig Auswurf. 28. 6. und 19. 7. subj. beschwerdefrei. Appetit hat nachgelassen. Auswurf: 28. 6. 8—10 ccm. Tbc.-Baz.: 8. 6. + 3; 4. 7. + 3; Blut: BKS. 8. 6. + 24, 10. 7. + 30, 17. 7. + 28. Temp.: Zwischen 36,7 u. 37,0. Gewicht: 8. 6. 52,7 kg; 17. 7. 59,1 kg. Blutkalziumspiegel: 10. 7. 10,6 mg%. Röntgenologisch: Am 7. 6. bds. in den oberen Lungenpartien mäßig scharf begrenzte fleckige Trübungen. L. infraclav. u. lat. sowie mitten im O-Feld größere flächige Trübungen mit unsicherer Begrenzung. Querverlagerte Rippen, langgezogener Herzschatten.

Versuchz. — 19. 8. Lungenbefund: 19. 7. status idem, 9. 8. l. ist der Katarrh besser geworden, R. v. im oberen Abschnitt Brummen, sonst status idem. Beschwerden: 9. 8. vermehrter Huften. Auswurf: 19. 7. 8—10 ccm; 9. 8. 5—8 ccm, Tbc.-Baz.: 30. 7. + 2. Blut: 24. 7. + 22. Temp.: 3. 8—6. 8. erhöht, fiel dann zur Norm. Gewicht: 31. 7. 60,6 kg; 14. 8. 60,0 kg. Blutkalziumspiegel: 24. 7. 11,7 mg%.

Nachb. — 5. 9. Lungenbefund: 29. 8. status idem; 5. 9. r. o. spärkl. klingende Rg. Beschwerden: 29. 8. Spannungsgefühl i. d. l. Brust; 5. 9. subj. Wohlbef., noch Huften. Auswurf: 29. 8. 8 ccm. Tbc.-Baz.: 23. 8. + 1. Blut: 29. 8. + 15. Temp.: normal. Gewicht: 29. 8. 60,4; 3. 9. 60 kg Blutkalziumspiegel: 29. 8. 10,7

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal täglich einen Teelöffel Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um eine knotig kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit keine Änderung des Lungenbefundes, keine Beschwerden, Temperatur normal, keine Änderung der Auswurfsmenge und Bazillenzahl, die Senkung blieb konstant erhöht. Gewichtszunahme um 6,4 kg.

Während der Versuchszeit ließ der Katarrh l. etwas nach, Huften nahm etwas zu, vorübergehender Fieberanstieg, Bazillenzahl nahm ab, Rückgang der Auswurfsmenge, Senkung wurde etwas langsamer. Keine Gewichtszunahme. Der Blutkalkspiegel zeigte eine Steigerung.

Während der Nachbeobachtungszeit zeigte der Lungenbefund keine wesentliche Änderung, der Huften nahm zu, Temperatur blieb normal, der Auswurf wurde etwas weniger, desgleichen die Bazillenzahl, Senkungsbefleunigung weiter langsamer, kein Gewichtsgewinn mehr. Der Blutkalkspiegel fiel wieder.

Rückgang der exsudativen Symptome ob aber infolge Kalziumtherapie ist sehr fraglich. Die Steigerung des Kalkspiegels ist hier offensichtlich, aber der Lungenprozeß hat sich nicht verändert.

Fall 3) B. K.

1930 Ohrensaufen und eine Zeitlang gehustet. Anfang April 1934 kurzatmig bei Treppensteigen, Husten und Auswurf. Der Arzt stellte Lungentbc. fest.

Vorbeobacht. v. 14. 6.—1. 8. Lungenbefund: Über beide Lungen fast in ganzer Ausdehnung, l. etwas weiter als r, reichend, verkürzter Klopfschall und gemischt-rauhes Atmen mit hauchender Ausatmung. L. v. u. h. o. fast amphorisch und bronchial klingende Atmung. Beiderseits über der oberen Lungenhälfte mittelfeucht klingender Katarrh. 6. 7. status idem, 26. 7. status idem. Beschwerden: 15. 6. morgens Husten, linksf. Brustschmerzen. 6. 7. subjektiv gut, morgens Husten, Atemnot beim Treppensteigen. 26. 7. subjektiv gut, morgens Husten. Auswurf: 14. 6. 30—40 ccm; 6. 7. 30 ccm; 26. 7. 20—30 ccm. Tbc.-Baz.: 15. 6. + 3; 12. 7. + 2. Blut: BKS. 15. 6. + 10; 17. 7. + 15; 24. 7. + 12. Temp.: Zwischen 36,5—37,0; ab 19. 6. bis 22. 6. 36,1—36,6; ab 23. 6. 36,1—36,8. Gewicht: 15. 6. 55,9 kg; 31. 7. 63,5 kg. Blutkalziumspiegel: 10. 7. 11,5 mg%; 24. 7. 11,8 mg%. Röntgenologisch: 15. 6. obere Hälfte beider Lungenfelder confl. fleckig durchsetzt. Rechts mehr grobfleckig-verwaschen, links mehr scharf begrenzt mit mehreren ringfaltenähnlichen Zeichnungen im Oberfeld. In den unteren Lungenfeldern verstreute, kleinere und scharfer begrenzte Fleckschatten.

Versuchsz.: — 25. 8. Lungenbefund: 14. 8. Katarrh noch immer vorhanden. Beschwerden: 14. 8. subjektiv gut, morgens Husten. Auswurf: 14. 8. 30 ccm. Tbc.-Baz.: 8. 8. + 3. Blut: —. Temp.: Anfangs normal v. 6.—9. 8. subfebril, dgl. am 17. 8., sonst normal. Gewicht: 16. 8. 62,7 kg.

Nachbeob. — 4. 9. Lungenbefund: 4. 9. status idem. Beschwerden: 4. 9. subjektiv gut, kurzatmig. Husten. Auswurf: 5. 9. 30 ccm. Tbc.-Baz.: 3. 9. + 2. Blut: 29. 8. + 9. Temp.: normal. Gewicht: 29. 8. 61,7; 3. 8. 61,7 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 8. 11,2.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal tägl. einen Teelöffel Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um eine knotig confluierende und kav. Lungentbc. mit cirrh. Vorgängen mit Exsudation.

In der Vorbeobachtungszeit keine Änderung des Lungenbefundes auch nicht der Beschwerden, Temperatur hielt sich unter 37,0. Die Auswurfsmenge blieb konstant, dgl. die Senkung und die Bazillenzahl. Gewichtszunahme um 8 kg.

In der Versuchszeit keine wesentliche Änderung des Lungenbefundes sowie der Beschwerden, der Auswurfsmenge und der Bazillenzahl. Temperatur war teilweise subfebril. Leichter Gewichtsverlust.

In der Nachbeobachtung keine Änderung des Lungenbefundes, der Beschwerden, der Auswurfsmenge und der Bazillenzahl. Temperatur normal. Weiterhin leichter Gewichtsverlust.

Keine Änderung der Form der Tuberkulose und auch keine Wirkung auf den Blutkalziumspiegel unter der Kalziumtherapie. Der Versuch ist demnach als negativ zu bewerten.

Fall 4) J. R.

Familie tuberkulös belastet. Seit 1933 Schmerzen im Rücken, Husten mit teilweise blutigem Auswurf, dazu Nachtschweiß. Ende des Jahres wurde in der Poliklinik ein Pneumothorax angelegt. Weiterhin Gewichtsverlust.

Vorbeobacht. v. 2. bis 24. 10. 1934. Lungenbefund: 2. 10. L. h. u. vereinzelt feinblasig. Rasseln. Vorn R. v. skapula Mitte abwärts Dämpfung im u. Teil der Dämpfg. aufgehobenes Atmen. 15. 10. status idem. 20. 10. status idem. Beschwerden: 2. 10. Nachtschweiß, Husten, schlecht. Allgemeinbefinden. 6. 10. leichte Besserung des Allgemeinbefindens. 10. 10. Husten geringer. 20. 10. Weiterhin Besserung. Auswurf: Ging von 30—50 ccm auf 0 zurück. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: BKS. 3. 10. + 72, Diff. Eos. 8%, Segm. 56%, Lymph. 27%, Mon. 4%, Stb. 5%. Temp.: 3. bis 9. 10. 37,4—38,1, 10. bis 24. 10. 37,0—37,7. Gewicht: 2. 10. 55 kg, 22. 10. 56,1 kg. Blutkalziumspiegel: 17. 10. 11,0, 24. 10. 11,2 mg%. Röntgenol.: 3. 9. Seropneu. r. erhebl. Ausmaßes. Oberlappen Tbc. l. (indurativ).

Versuchsz. — 19. 11. Lungenbefund: 2. 11. Dämpfg. r. noch 4 Querfinger hoch. 20. 11. status idem. Beschwerden: 12. 11. Allgemeinbefinden gebess. 16. 11. Husten weniger, Appetit besser. Auswurf: gering. Tbc.-Baz.: negativ. Blut.: 5. 11. + 62, Eos 2%, Segm. 71%, Lymph. 27%. Temp.: 25. bis 10. 11. 37,0—37,8; 10. bis 19. 11. um 37,0. Gewicht: 25. 10. 57,4 kg, 19. 11. 58,1 kg. Blutkalziumspiegel: 19. 11. 10,0 mg%. Röntgenologisch: 13. 11. Exfudat fast völlig resorbiert. Schwartenbildung.

Nachb. — 24. 11. Lungenbefund: 24. 11. Exfudat verschwund. Beschwerden: 21. 11. Wohlbef. Auswurf: gering. Tbc.-Baz.: negativ. Temp.: um 37,0.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os täglich 20,0.

Epikrise:

Es handelte sich bei der Aufnahme um eine indurative cir. Tbc. des linken Oberlappens, rechts bestand ein großes Exfudat (Seropneu). Subjektive Beschwerden, Blutsenkung, Blutbild, Temperatur sprachen eindeutig für die Aktivität des Prozesses.

In der Vorbeobachtungszeit ist eine geringe Besserung des Allgemeinbefindens eingetreten, die Auswurfsmenge ging ganz zurück, das Gewicht stieg um 1,1 kg.

In der Versuchszeit ging die Dämpfung zurück, das Allgemeinbefinden besserte sich, geringer Auswurf trat ein, die Senkungsbeschleunigung ging um 10 mm zurück, die Linksverschiebung verschwand, das Gewicht stieg weiterhin um 2,0 kg. Das Exsudat ging fast völlig zurück und Besserung der Temperatur.

In der Nachbeobachtungszeit war keine Veränderung festzustellen, sie war aber auch zu kurz.

Während der Versuchszeit ging hier einwandfrei das Exsudat zurück, dazu besserte sich die Temperatur. Da aber hier die Rö.-Nachkontrolle fehlt, kann man den Versuch nicht als einwandfrei positiv bezeichnen. Der Kalkspiegel reagierte auf Kalkapplikation mit einem Abfallen des Blutkalkspiegels.

Fall 5) W. R.

Seit Juli 1934 müde. Vor drei Wochen Rippenfellreizung gehabt. Sonst nie ernstlich krank gewesen.

Vorbeobachtg. v. 2. 10. bis 24. 10. 1934. Lungenbefund: 2. 10. Verschärftes Atmen in d. h. u. Partien. L. hinten vereinzelt Knisterrasseln. Am 10. 10. status idem. Beschwerden: 2. 10. Schlechtes Allgemeinbef., er ist müde und matt. 10. 10. wesentliche Besserung. 20. 10. status idem. Auswurf: 2 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: BKS: 2. 10. + 9, Eos 1%, Stab. 18%, Segm. 54%, Lymph. 20%, Mono. 7%. Temp.: zwischen 37,8—38,4. Gewicht: 3. 10. 52,9 kg, 22. 10. 53,8 kg. Blutkalziumspiegel: 17. 10. 14,0 mg%, 24. 10. 12,3 mg%. Röntgenologisch: 3. 10. Lunge symmetrisch von feinsten Fleckschatten befällt. Pneumokoniose 2. Grades oder Miliartbc.

Versuchsz. — 19. 11. Lungenbefund: 20. 10. status idem, 18. 11. status idem. Beschwerden: 27. 10. Husten, Appetitmangel, Kopfschmerzen. 4. 11. Nierenschm., Verschlechterung d. Zustandes. 20. 11. Nachtschweiß, Atemnot, quälender Husten. Verschl. d. Zustandes, leichte Psychose, allg. Schwäche. Auswurf: langsam steigend bis 20 ccm. Tbc.-Baz.: imal +. Blut: 14. 11. + 30, Stab. 24%, Segm. 44%, Lymph. 25%, Mono. 7%. Temp.: langsam steigend bis 38,6. Gewicht: 29. 10. 53,7 kg, 12. 11. 52,0 kg. Blutkalziumspiegel: 19. 11. 10,0. Röntgenologisch: 13. 11. Die Herde sind größer geworden und liegen im Mittel- und Oberfeld dichter.

Nachb. — 26. 11. Beschwerden: 25. 11. Cyanose, Atemnot, 26. 11. Fadenf. Puls, Hustenanfall, Exitus. Auswurf: bis 20 ccm. Tbc.-Baz.: —. Temp. dauernd über 38.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal täglich 20,0 Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich bei der Aufnahme um eine allgemeine haematogene Tuberkulose, die nach anfänglich ruhigem Verlauf zu einer schweren Allgemeinintoxikation führte

In der Vorbeobachtungszeit war eine geringe Besserung des Allgemeinbefindens eingetreten, die Auswurfsmenge ging zurück, das Gewicht stieg um 0,9 kg.

In der Versuchszeit trat eine Verschlechterung des Allgemeinbefindens ein, Husten, Atemnot, Nachtschweiß, leichte Psychose traten auf. Die Auswurfsmenge stieg an, wogegen das Gewicht fiel.

In der Nachbeobachtungszeit verschlechterte sich der Zustand so sehr, daß Patient ad exitum kam.

Keine Wirkung der Kalziumtherapie auf den Blutkalkspiegel. Auch keine Wirkung auf die Form und Stärke der Tuberkulose. Der Versuch ist also als negativ zu bewerten.

Fall 6) H. S.

Keine Lungenerkrankungen in der Familie. Er selbst hat als Kind Augensarkulose gehabt. Seit 1927 Magenkrank, seit 1930 dazu Husten, 1932 Auswurf, 1933 müde, Nachtschweiß, starker Husten und Appetitlosigkeit. 1934 vier Monate in Hohen-Honnet.

Vorbeobacht. v. 24. 10. bis 7. 1. 1935. Lungenbefund: 24. 10. R. Oberfeld Schallverk. mit Bronchialatmen u. klein-mittelblasigen Rg. L. h. o. verschärft. 1. 12. status idem. Beschwerden: Erbrechen, Druckgefühl in Magengegend, Husten, Auswurf, Nachtschweiß, Atemnot. 3. 11. Leubekur. 10. 11. Nach Breikost Beschwerden geringer. 20. 12. erneute Magenbeschwerden. 3. 1. Heftigere Magenbeschwerden, Diarrhoe, Appetitlosigkeit, schlechtes Allgemeinbefinden. Auswurf: Die Menge wechselt zwischen 5 u. 10 ccm, Tbc.-Baz.: 26. 11. + 1; 28. 12. + 2. Blut: BKS, 24. 10. + 45, 24. 11. + 42, 5. 1. + 71, Diff. 16. 11. Eos 1%. Stab. 6%, Segm. 53%, Lymph. 37% Mono. 3%. Temp.: zwischen 36,8 u. 37,2. Gewicht: 24. 10. 46,8 kg. 8. 1. 48,4 kg. Röntgen.: 25. 10. cirrh. Oberlappentbc. r. Indurative Veränderungen auch l. o. R. Oberlappen Kavernenverdacht. Schrumpfungsercheinung im r. Oberlappen. Zustand nach Phrenicuschädig. r. Blutkalziumspiegel: 7. 1. 1935 11,1 mg%.

Versuchsz. — 29. 1. Lungenbefund: —. Beschwerden: 20. 1. Magenbeschwerden, sehr matt. Auswurf: 5 ccm. Tbc.-Baz.: 8. 1. u. 15. 1. + 1. Blut: 16. 1. + 3; 28. 1. + 46. Temp. zwischen 36,7 u. 37,2. Gewicht: 28. 1. 49,4 kg. Röntgen.: 22. 1. großes Kavum in r. Spitzenfeld. 28. 1. große Spitzenkaverne r. auch med. infraclav. eine markstückgroße kavernenverdächtige Aufhellung. Blutkalziumspiegel: 29. 1. 11,0 mg%.

Nachb. — 22. 2. Lungenbefund: 8. 2. Pneu. r. 22. 2. Lungenbef. unverändert. Beschwerden: v. 30. 1. bis 2. 2. Mandelentz. 2. 2. Magen Spiegelung. 8. 2. Keine Magenbeschwerden mehr. Auswurf: 5 ccm. Tbc.-Baz.: —. But: 21. 2. + 45, Eos, 2%, Stab. 15%, Segm. 51%, Lymph. 24%, Bas. 1%, Meta. 7%. Temp. zwischen 36,8 u. 37,2. Gewicht: 11. 2. 48,6 kg, 18. 2. 48,8 kg. Röntgen.: 14. 2. beginnende Verkl. d. r. Spitzenkaverne.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os tägl. 20,0 Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich bei der Aufnahme um eine cirrh. Oberlappentbc. rechts, dazu Kaverne im r. Oberfell. Dazu besteht eine Gastritis. Subjektive Beschwerden, Blutsenkung, Blutbild, Temperatur sprachen eindeutig für die Aktivität des Prozesses.

In der Vorbeobachtungszeit keine Besserung des Allgemeinbefindens, der Auswurfsmenge. Die Temperatur ging ein wenig zurück, das Gewicht stieg um 1,6 kg.

In der Versuchszeit keine Besserung des Allgemeinbefindens, der Auswurfsmenge und der Temperatur. Das Gewicht stieg weiterhin um 1,0 kg. Die Menge der Tuberkelbazillen ging etwas zurück.

In der Nachbeobachtungszeit traten vorübergehend Halschmerzen auf. Die Magenbeschwerden verschwanden nach der Magen Spiegelung. Das Blutbild zeigte eine starke Linksverschiebung. Leichtes Fallen des Gewichtes.

Keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf Form und Stärke der Tuberkulose. Auch keine Wirkung auf den Kalziumspiegel des Blutes. Der Versuch ist demnach als negativ zu bewerten.

Fall 7) W. B.

Ein Junge starb mit sieben Jahren an Meningitis. Seit dem Kriege leidet er an Gelenkrheuma, Winter 33/34 Grippe, von der er sich nicht richtig erholte, hatte danach Husten und Schmerzen in der rechten Brustseite. Im April zum zweiten Male Grippe, hatte danach Husten, Nachtschweiß und Auswurf. In der letzten Zeit stärker werden seiner Beschwerden.

Vorbeobachtg. 3. 11. bis 12. 12. 1934. Lungenbefund: Rechts o. geringe Schallverk., V. l. o. zahlreiche nicht klingende klein-mittelblaßige Rg. 16. 11. nur noch vereinzelt Rg. vorn l. Schallverkürzung besteht noch, 30. 11. status idem. Beschwerden: 22. 11. Besserung des Allgemeinzustandes. 6. 12. Beschwerdefreiheit bis auf leichten Husten. 12. 12. status idem. Auswurf: 15. 11. 5—10 ccm, 12. 12. 3 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 13. 11. BKS. + 80, Eos 3%, Stab. 6%, Segm. 60%, Lymph. 27%, Mono. 4%, 11. 11. + 38, 2%, 4% 70%, 21%, 3%. Temp.: um 37,0. Gewicht: 5. 11. 59,9 kg, 10. 12. 66,0 kg. Blutkalziumspiegel: 11. 12. 11,3 mg%. Röntgenol.: 1. 8. 1934. Im l. Spitzen- und O-Feld zahlreiche wolkige z. T. confl. Verschattungen. Verdacht auf

Kaverne im l. Oberfeld. Tbc. pulmonis duplex. 10. 11. Schrumpfung im l. Oberfeld. Sonst keine Änderung. 3. 12. Keine Änderung des Befundes.

Verfuchsz. — 7. 1. 1935. Lungenbefund: 28. 12. keine Zeichen von Katarrh mehr über d. Lunge. Beschwerden: 20. 12. status idem. Auswurf: 5. 1. 1—2 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 7. 1. BKS + 48, Eos. 2%, Stab. 14%, Segm. 49%, Lymph. 26%, Mono. 8%. Bas. 1%. Temp.: zwischen 36,6 u. 37,0. Gewicht: 17. 12. 67,0 kg. 4. 1. 67,5 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 12. 10,2; 3. 1. 10,4 mg%.

Nachb. — 23. 2. 1935. Lungenbefund: 12. 2. status idem. Beschwerden: 15. 1. gutes Wohlbefinden. 12. 2. dito. Auswurf: 23. 2. 0 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 21. 1. + 42, 3%, 17%, 42%, 30%, 7%, 1%. Temp.: zwischen 36,6 u. 37,0. Gewicht: 14. 1. 67,9, 18. 2. 68,8 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 1. 10,6. Röntgenol.: 17. 1. Gegenüber dem vorig. Befunde keine wesentliche Änderung.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os 25mal 20,0 Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um eine doppelseitige exsudative Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Besserung des Katarrhs, der Beschwerden, des Auswurfs, der Senkung, Zunahme des Gewichtes um 6 kg.

In der Versuchszeit weiterhin Besserung des Lungenbefundes, der Beschwerden, des Auswurfs, die Senkung blieb fast unverändert, leichter Gewichtsanstieg, Blutkalkspiegel sank.

In der Nachbeobachtungszeit weiterhin Besserung, dazu leichter Gewichtsanstieg.

Keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf Stärke und Form der Tuberkulose. Auch keine Wirkung auf den Kalziumspiegel im Blute. Der Versuch ist als negativ zu bewerten.

Fall 8) M. S.

1931 wurde eine Lungentbc. festgestellt. Heilbehandlung in Roßbach. Befinden wechselte. Mai 1934 doppelseitige Lungenentzündung. Vor sechs Wochen erkältete er sich, seitdem starke Schmerzen über der rechten Brustseite. Im hohen Fieber sei er unruhig geworden, dadurch in die Psychiatrische gekommen, von dort zur Medizinischen.

Vorbeachtg. vom 5. 11. bis 11. 12. 1934. Lungenbefund: 5. 11. r. über der Spitze geringe Schallverkürzung. Nach abwärts teils bronchial, teils bronchovesiculär. Atmen, dazu klingende Rg. 7. 11. Katarrh weniger. 25. 11. L. h. u. bronchovesiculäres Atmen und feinblasiges Rasseln. Beschwerden: Schmerzen in rechter Brustseite. 17. 11. keine Beschwerden 25. 11. Schmerzen r. h. u. 8. 12. keine stärkeren Beschwerden bis auf Husten. Auswurf: 1—2 ccm. Tbc.-Baz.: 7. 11. + 2. 10. 12. + 1. Blut: 28. 11. BKS. + 68, Eos. 2%, Stab. 5%, Segm. 48%, Lymph. 45%. 9. 12. + 83, 5%, 9%, 61%, 25%. Temp.: 5. 11. bis 18. 11. 37,0—37,6; 19. 11. bis 25. 11. 37,6—38,0;

25. 11. bis 11. 12. 36,8—37,8. Gewicht: 5. 11. 54,1 kg, 9. 12. 59,0 kg. Blutkalziumpiegel: 11. 12. 11,0 mg%. Röntgenol.: Ausgedehnte fibröse Tbc. der ganzen r. Lunge u. der ob. Partie der l. Lunge. Pleurareaktionen. Veränderungen rechts sind auf Aktivität verdächtig.

Verfuchsz. — 3. 1. 1935. Lungenbefund: —. Beschwerden: 18. 12. Husten mit Auswurf. Schmerzen r. Thorax. 28. 12. keine stärkeren Beschwerden. Auswurf: unter 1ccm. Blut: 2. 1. + 60. Temp.: um 37,0. Gewicht: 30. 12. 59,5 kg. Blutkalziumspiegel: 3. 1. -935 11,3 mg%.

Nachb. — 4. 1. 1935: —.

Er bekam in der Verfuhszeit Kalzium per os tägl. 20,0 Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um eine produktiv-cirr. Lugen tbc. Subjektive Beschwerden, Blutlenkung, Blutbild sprachen einwandfrei für eine Aktivität des Prozesses.

In der Vorbeobachtungszeit besserten sich die Beschwerden, der Temperaturverlauf wechselte, der Auswurf war nur gering. Die Bazillenzahl ging zurück. Die Gewichtszunahme betrug fast 5 kg.

In der Verfuhszeit weiterhin Besserung der Beschwerden, die Temperatur sank, die Auswurfsmenge ging zurück. Die Gewichtszunahme war sehr gering. Die erhöhte Senkung ging ein wenig zurück.

In der Nachbeobachtungszeit keine wesentliche Änderung festzustellen, sie war ja auch zu kurz.

Keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tuberkulose, also demnach ein negatives Ergebnis. Die leichte Kalziumsteigerung des Blutes liegt im Bereich der Verfuhsfehlergrenze.

Fall 9) J. v. K.

Mit neun Jahren Nasenbluten. Ab 27. Lebensjahr jedes Jahr im November Nasenbluten. November 1933 Erkältung mit Husten, man stellte Lungen spitzenkatarrh fest. Drei Wochen später erneut Erkältung, danach nicht mehr richtig erholt. Seit drei Tagen Auswurf, Nachtschweiß und Fieber mit Husten. In l. Schulter Stiche und Brustschmerzen beim Husten.

Vorbeobachtung vom 10. 10. bis 2. 1. 1935. Lungenbefund: 10. 10. Dämpfung h. l., dazu Bronchialatmen. Über ganzen Lunge verschärftes Atmen. Stimmfremitus l. o. h. verstärkt. Deutliche Bronchophonie, weiterhin klingende Rg. 4. 11. status idem. 23. 11. status idem. Beschwerden: 20. 10. keine Schmerzen mehr. 30. 10. subj. Wohlbefinden. 4. 11. Auftreten von Kopfschmerzen. 9. 11. dazu Abgeschlagenheit. 19. 11. Schmerzen ü. r. Spitze. 15. 12. l. Schulter schmerzen. Auswurf: 10. 10. 5 ccm; 10. 11. 10 ccm; 10. 12. 20 ccm; 2. 1. 50 ccm. Tbc.-Baz.: 16. 10. + 2, 16. 11. + 2, 12. 12. + 0. Blut:

BKS. 12. 10. + 32, 12. 11. + 75, 12. 12. + 55. 12. 10. Eös. 6%, Stab. 13%, Segm. 65%, Lymph. 28%, Mono. 7%, Meta. —; 12. 11. 1, 8, 60, 20, 11%; 12. 12. 2, 2, 64, 30, 2%. Temp. 10. 10. bis 4. 11. 36,8—37,6, 5. 11. bis 11. 11. 37,6—38,5, 12. 11 bis 3. 12. 37,0—37,7, 4. 12. bis 2. 1. 37,0—37,8. Gewicht: 13. 10. 58,4 kg; 1. 1. 64,6 kg. Blutkalziumspiegel: 2. 1. 9 mg%. Röntgenol.: 13. 10. Tbc. beider Oberlappen bef. l., hier mit Cavum. 13. 11. Ausbreitung des spez. Spitzenprozesses i. l. Mittelfeld u. d. u. d. l. Oberfeldes.

Versuchsz. — 4. 2. 1935: Lungenbefund: 25. 1. Pneuanlage. 4. 2. Über ganzer l. Lunge hyperphononier Klopfschall mit tymp. Beiklang. Atmen abgeschwächt bis aufgehoben. Über ganzer l. u. r. Lunge infraclav. klingende Rg. Beschwerden: 26. 1. Verstärkung d. Schulterchmerzen. 4. 2. leichte Besserung. Auswurf: 10. 1. 20—120 ccm, 2. 2. — 50 ccm. Tbc.-Baz.: 10. 1. + 1. Blut: 12. 1. + 77; 30. 1. + 80. 12. 1. 3, 11,5, 45,5 31, 8,5 %; 30. 1. 3, 6, 58,5 23, 9,5%. Temp.: 3. 1. bis 25. 1. 37,2—38; 26. 1. bis 4. 2. 36,8—37,2. Gewicht: 8. 1. 65,6 kg; 4. 2. 63 kg. Blutkalziumspiegel: 4. 2. 10,8 mg%. Röntgenol.: 21. 1. Kavum ist größer geworden. Exsudativer Prozeß i. l. Mittelfeld. 25. 1. kleiner Pneu. l. 1. 2. Pneu i. l. Spitzenbereich ist heute ausgedehnter.

Nachb. — 5. 4. Lungenbefund: 15. 2. Pneu. nachgefüllt. 5. 4. dito. Beschwerden: 11. 3. starker Hustenreiz; 5. 4. dazu noch heftiger Auswurf. Auswurf: 10. 3. — 60 ccm; 5. 4. — 100 ccm. Tbc.-Baz.: 10. 2. + 1; 10. 3. + 1. Blut: 12. 2. + 45; 26. 3. + 100. 12. 2. 3, 5, 56, 29,5, 5,5% —; 26. 3. 1, 18, 47,5, 24, 4, 5%. Temp.: 5. 2. bis 1. 3. 36,8—37,4; 2. 3. bis 5. 4. 37,2—37,8. Gewicht: 11. 2. 62,7 kg; 1. 4. 59 kg. Blutkalziumspiegel: —. Röntgenol.: 15. 2. Pneu nimmt zu; 27. 2. dito; 29. 3. dito. Die Cava l. etwas kompr. Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os 35mal 20,0 Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um eine doppelseitige Lungentbc. mit vorwiegend exsudativen Herden in beiden Oberfeldern bei erheblicher Aktivität und Neigung zur Progredienz.

In der Vorbeobachtungszeit keine wesentliche Lungenbefundsänderung, kaum Änderung der Beschwerden, leichte Temperaturschwankung, keine Besserung des Auswurfes; es bestand Besserung des Bazillenbefundes, Abnahme der Linksverschiebung und leichte Senkung der erhöhten Senkung, Gewichtszunahme um 6 kg. Röntg. Ausbreitung der Tbc.

In der Versuchszeit leichte Besserung der Beschwerden, Verschlechterung der Linksverschiebung, des Gewichtes und des Bazillenbefundes. Der Blutkalziumspiegel stieg.

In der Nachbeobachtungszeit allgemeine Verschlechterung.

Keine Wirkung auf die Form und Stärke der Tbc. unter der Kalziumtherapie. Wohl Ansteigen des Blutkalkspiegels. Hier in diesem Falle ist die Pneuanlage während der Versuchszeit ein glatter Versuchsfehler, wodurch dieser Fall für eine Bewertung nichtig geworden ist.

Fall 10) H. B.

Nach der Grippe im Winter hat er sich nicht mehr erholt. Klagt über Husten, Nachtschweiß und Müdigkeit. Im Frühjahr 1934 Pneu angelegt, danach Kur in Hohen-Honnef. Anfangs Besserung, kommt jetzt zur Kurwiederholung zur Medizini-schen.

Vorbeobachtg. vom 12. 7. bis 24. 10. Lungenbefund: R. oben hyperphononer Klopffschall. Kein Atemgeräusch zu hören. L. über ganzer Lunge vereinzelt Rg., nicht klingend, normaler Klopffschall. 17. 7. Pleurapunktion; 2. 8. 500 ccm punktiert; 10. 8. 800 ccm punktiert; 20. 8. 850 ccm punktiert; 29. 8. 500 ccm punktiert; 6. 9. 700 ccm punktiert; 25. 9. 1500 ccm punktiert; 3. 10. Punktion. Beschwerden: Matt, Nachtschweiß, Husten mit Auswurf. 28. 7. subj. Wohlbefinden; 6. 8. dito; 6. 9. wenig Beschwerden; 10. 9. gutes Allgemeinbefinden; 3. 10. dito. Auswurf: 12. 7. — 2 ccm; 12. 8. — 1 ccm; 12. 9. — 1 ccm; 24. 10. 0 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 15. 7. BKS. 42, Eos. 2, Segm. 73, Stab. 5, Lymph. 18 Mon. 2%; 2. 10. 21, —, 68, 11, 18, 5%. Temp.: 12. 7. bis 17. 7. 38—38,7; 18. 7. bis 19. 7. 38,8—39,7; 20. 7. bis 1. 9. 37,7—38,4; 2. 9. bis 5. 10. 37,4—38,2; 5. 10. bis 24. 10. 36,8—37,6. Gewicht: 12. 12. 70,5 kg; 23. 10. 74,2 kg. Blutkalziumspiegel: 17. 10. 11,8 mg%; 24. 10. 11,8 mg%. Röntgenol.: 14. 7. Exfudat r., Pneu r. Stauungslunge l. Verdrängungserscheinung des Herzens.

Verfuchsz. — 27. 11. Lungenbefund: 12. 11. die ganze r. Thoraxhälfte beginnt zu schrumpfen. 30. 11. r. Klopffschall abgeschwächt mit tymp. Beklang. L. normaler Klopffschall mit Rg. Punktionen: 25. 10. 20 ccm; 29. 10. 1150 ccm; 8. 11. 1250 ccm; 17. 11. 1100 ccm; 27. 11. 1250 ccm. Beschwerden: 24. 11. Allgemeinbefinden in letzter Zeit etwas schlechter. Subj. keine Beschwerden. Auswurf: 24. 11. — 1 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 21. 11. 25, — 45,5, 6, 20, 6%. Temp.: 24. 10. bis 6. 11. 37,2—38,1; 7. 11. bis 9. 11. 38—38,8; 10. 11. bis 28. 11. 37—37,6. Gewicht: 29. 10. 76,5 kg; 26. 11. 75,0 kg. Blutkalziumspiegel: 19. 11. 11,6; 27. 11. 11,6 mg%. Röntgenol.: Exfudat r. niedriger gweorden.

Nachb. — 10. 2. 1935. Lungenbefund: Punktionen: 5. 12. 1100 ccm; 15. 12. 1100 ccm, dazu 20 ccm Jodipinöleinfüllung; 19. 12. 1000 ccm; 24. 12. 100 ccm u. Jodipinöl; 29. 12. 750 ccm u. 150 Jodipinöl; 14. 1. 350 ccm; 21. 1. 900 ccm; 25. 1. 500 ccm; 31. 1. 700 ccm; 7. 2. 600 ccm; 10. 2. 500 ccm. Beschwerden: 3. 12. Verschlechterung; 17. 12. sehr elend; 14. 1. weiter Verschlechterung; 10. 2. Verleg. z. Chirurgie. Auswurf: 24. 12. — 2 ccm; 24. 1. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: negativ. But: 8. 1. 68, 5,5, 54,5, 15,5, 26, 7,5%; 4. 2. —, 3, —, 13, 22, 6,5%. Temp.: 29. 11. bis 4. 12. 37,6—37,8; 5. 12. 38,0; 6. 12. bis 10. 12. 37,2—37,8; 11. 12. bis 20. 12. 38,—40,0; 21. 12. bis 6. 1. 36,7—37,7; 7. 1. bis 8. 1. 38,5—30,0; 9. 1. bis 22. 1. 37,0—38,0; 23. 1. 40,0;

24. 1. bis 10. 2. 37,0—38,0. Gewicht: 4. 2. 67,7 kg. Röntgenol.: 3. 12. Pneu r. hat zugenommen.

Er bekam in der Versuchszeit in der Versuchszeit Kalzium per os 34mal 20,0 Oraldin.

Epikrise:

Es handelte sich um ein tbc-Pleuraempyem mit Pneumothorax rechts und Stauungslunge links.

In der Vorbeobachtungszeit keine Änderung des Lungenbefundes, die Beschwerden und beschleunigte Senkung besserten sich etwas. Die Temperatur wechselt stark, Auswurf war sehr gering, Gewichtszunahme um fast 4 kg.

In der Versuchszeit Schrumpfung der rechten Thoraxhälfte, sonst keine wesentliche Besserung des Lungenbefundes. Verschlechterung des Allgemeinbefindens, der Senkung, leichter Gewichtsverlust. Blutkalzium blieb unverändert. Starke Temperaturschwankungen.

In der Nachbeobachtungszeit keine Besserung des Lungenbefundes. Verschlechterung des Allgemeinbefindens, der Senkung, Zunahme der Linksverschiebung im Anfang, starker Gewichtsverlust. Röntg. Zunahme des Pneu. Schrumpfungstendenz des Exsudates?

Außer Schrumpfung des Prozesses keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tuberkulose. Der Blutkalkspiegel blieb unverändert. Der Versuch ist als fraglich anzusehen.

Fall 11) A. K.

Ein Bruder mit 28 Jahren an Kehlkopftbc. gestorben. Zwei Schwestern an Lungentbc. gestorben. Ein Bruder an Sepsis gestorben. Januar 1933 14 Tage an Grippe erkrankt. Seit Dez. 1933 Husten mit Auswurf.

Vorbeobacht. vom 30. 5. bis 3. 7. 1934. Lungenbefund: Beiderl. ob. Lungenhälfte r. vorn bis Basis reich. verk. Klopffschall, gem.-rauhes Atmen m. hauchender Ausatmung und reichl. mittel. v. o. auch großblasigen feuchtklingende Rg. Über den unteren Lungenabschnitten etwas tympanischer Klopffschall u. abgeschwächt rauh-scharfes Atmen. 22. 6. status idem. Beschwerden: Starker Husten, Brustschmerzen, abends kratzen im Hals. 22. 6. Husten hat nachgelassen. Auswurf: 6. 6. 75 ccm; 22. 6. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 1. 6. +3; 28. 6. + 3. Blut: BKS. 1. 6. + 35; 28. 6. + 34. Temp.: Anfangs leicht subfebril, vom 30. 5. bis 15. 6.; 16. 6. bis 1. 8. 36,9—37,2; 2. bis 9. 7. subfebril. Gewicht: 1. 6. 65,2 kg; 2. 7. 70,8 kg. Blutkalziumspiegel: 22. 6. 11,9 mg%; 28. 6. 11,6 mg%. Röntgenol.: In dem rechten Lungenfeld und obere Hälfte Ringschatten-system und verwachsen konfluierende Flecken. Im übrigen verstreute scharfe Fleckschatten besonders l. lat. im 3. IKR. Verdacht auf Aufhellung im linken Spitzengebiet. Doppelseitige kav. Lungentbc.

Versuchsz. — 21. 8. Lungenbefund: 12. 7. Katarrh ist etwas geringer; 1. 8. weiter Rückg. d. Katarrhes; 21. 8. nur noch feinbla. Rg. vereinzelt. Beschwerden: 12. 7. kein Husten mehr; 1. 8. subj. beschwerdefrei; 21. 8. subj. Wohlbefinden, wenig Husten. Auswurf: 12. 7. — 10 ccm; 1. 8. — 10 ccm; 21. 8. — 6 ccm. Tbc.-Baz.: 25. 7. + 3. Blut: 5. 7. + 22; 14. 8. + 6. Temp.: 2. bis 9. subfebril; 10. bis 18. 7. 36,8—37; 19. 7. bis 21. 8. 36,6—36,9. Gewicht: 17. 7. 73,3 kg; 14. 8. 78,4 kg. Blutkalziumspiegel: 5. 7. 11,1 mg% 15. 8. 10,1 mg%.

Nachb. — 28. 8. Lungenbefund: 27. 8. der Katarrh ist wesentlich zurückgegangen. Beschwerden: 27. 8. subj. Wohlb. Husten hat nachgelassen. Auswurf: 27. 8. —. Tbc.-Baz.: 28. 8. + 3. Blut: —. Temp.: 22. bis 27. 8. 36,6—36,9. Gewicht: 25. 8. 80,3 kg.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal 2 Tabletten Calc. lact. täglich.

Epikrise:

Es handelte sich um eine knotig kav. Lungentbc. mit Exsudation.

In der Vorbeobachtungszeit ließ der Lungenkatarrh ein wenig nach. Der Husten besserte sich. Die anfangs subfebrile Temperatur hielt sich um 37,0. Die Auswurfsmenge ging zurück, Gewichtszunahme um 5,6 kg. Der Bazillenbefund und die Senkung blieben konstant erhöht.

In der Versuchszeit ging der Lungenkatarrh weiter zurück, Patient wurde beschwerdefrei. Temperatur schwankte, blieb aber gegen Ende der Versuchszeit normal. Die Auswurfsmenge ging weiter zurück und die Senkung wurde normal. Bazillenbefund der gleiche. Weiter Gewichtszunahme um 5 kg. Der Blutkalziumspiegel sank unter der Kalziumtherapie.

In der kurzen Nachbeobachtungszeit ging der Katarrh weiterhin zurück, keine Beschwerden mehr, weiterhin Gewichtsanstieg.

In diesem Falle war eine leichte Besserung des Katarrhs und der Senkungsbefleunigung unter der Kalziumtherapie festzustellen. Der Blutkalkspiegel zeigte keine steigende Tendenz. Hier wäre also ein leichter therapeutischer Erfolg zu verzeichnen.

Fall 12) O. S.

Februar 1933 an Grippe erkrankt mit Husten, Nachtschweiß, Auswurf und Fieber, danach nicht richtig erholt. März 1933 Pneuanlage wegen Lungentbc. Anschließend bis 12. Dez. in Holterhausen, später ambulante Nachfüllung bis April 1934. Jetzt zur Kurwiederholung.

Vorbeobacht. vom 24. 5. bis 4. 7. 1934. Lungenbefund: Über der o. Lungenhälfte verk. Klopffschall u. gem.-rauhes Atmen. Über den u. Lungenabschnitten Atmung rauhf.-scharf. Beiderseits h. feinnittelblasige klingende Rg. Vorn r. o. vereinzelt Geräusche. Am 15. 6. status idem. 5. 7. status idem, Katarrh spärlicher. Beschwerden: 25. 5. wenig Husten, etwas heiser; 15. 6. einmal Nachtschweiß gehabt;

seit 26. 6. außerhalb des Bettes; 5. 7. keine Beschwerden mehr. Auswurf: 25. 5. wenig; 4. 7. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 25. 5 + 3; 26. 1 + 3. Blut: BKS. 25. 5. + 79; 4. 7. + 60. Temp.: 25. 5. erhöhte Temp.; 26. 5. bis 14. 6. 36,4—37,1; 15. 6. subfebril; 20. 6. bis 4. 7. 36,6—37,1. Gewicht: 25. 5. 53 kg; 2. 7. 56,2 kg. Blutkalziumspiegel: 22. 6. 11,4; 28. 6. 11,6; 4. 7. 11,0 mg%. Röntgenol.: Beide Lungenfelder r. mehr als l. durchsetzt mit klein-mittelgrob. kn. mäßig scharf begrenzte Fleckchen. R. im Oberfeld verdächtige rundliche Aufhellung.

Verfuchs. — 14. 8. Lungenbefund: 14. 7. status idem. Beschwerden: 14. 8. morgens Brechreiz, wenig Husten. Auswurf: 14. 8. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 16. 7. + 3; 9. 8. + 2. Blut: 14. 8. + 48; Temp.: 5. bis 16. 7. 36,6—37,1; 17. bis 25. 7. — 37,7; 26. bis 29. 7. 36,5—37,1; 30. 7. bis 14. 8. 36,6—37,1. Gewicht: 16. 7. 55 kg; 30. 7. 56,2 kg. Blutkalziumspiegel: 14. 8. 11,7 mg%.

Nachb. — 22. 8. Lungenbefund: 22. 8. status idem. Beschwerden: 22. 8. vermehrtes Husten. Auswurf: 22. 8. — 10 ccm. Temp.; 15. bis 22. 8. 36,6—37,2. Gewicht: 15. 8. 55,1 kg.

Er bekam in der Verfuhszeit Kalzium per os dreimal 2 Tabletten Calc. lact. täglich.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig kav. Lungentbc. mit exsudativem Charakter.

In der Vorbeobachtungszeit blieb der Lungenbefund unverändert, Beschwerden wurden gebessert, teilweise subfebrile Temperaturen, geringer Auswurf, leichtes Fallen der stark beschleunigten Senkung, 3 kg Gewichtsgewinn.

In Verfuhszeit etwas spärlicher werden des Katarrhs, keine Beschwerden. Teilweise subfebrile Temp. hielt sich um 37,0°. Geringer Auswurf, Abnahme der Bazillenzahl und weiterhin der Senkung, leichter Gewichtsgewinn. Leichtes Ansteigen des Blutkalziumspiegels.

In der Nachbeobachtungszeit blieb der Lungenbefund unverändert, wieder stärkerer Husten, Temp. um 37,0°. Geringer Auswurf, leichter Gewichtsverlust.

Keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf Form und Stärke der Tbc. Der Versuch wäre demnach als negativ zu werten in Bezug auf seinen therapeutischen Erfolg. Der Blutkalkspiegel zeigte leicht steigende Tendenz, war aber in der Vorbeobachtungszeit großen Schwankungen ausgesetzt, sodaß man kein genaues, sicheres Ergebnis ausagen kann.

Fall 13) M. M.

Vier Geschwister an Lungentbc. gestorben, 1923 Rippenfellentzündung links. Seit 1927 jedes Jahr Grippe. Mitte Dez. 1933 bei der Arbeit zusammengebrochen mit Atemnot, starkem Husten, Nachtschweiß und Auswurf. Seit dieser Zeit krank.

Vorbeobacht. vom 7. 6. bis 3. 7. 1934. Lungenbefund: Beiderseits über o. Hälfte Schallverkürzung mit gemilcht-rauhem Atmen und mittelblasigem Rg. Über unteren Partien rauh-scharfes Atmen: 28. 6. status idem. Beschwerden: Wenig Husten mit Nachtschweiß, etwas kurzatmig. 28. 6. wenig Husten, kein Nachtschweiß. Knotengefühl im Hals. Auswurf: Wenig bei der Aufnahme, dann auf o zurück. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: BKS. 8. 6. + 14; 3. 7. + 15. Temp. 7. 6. bis 3. 7. 36,6—36,9. Gewicht: 8. 6. 57,9 kg; 2. 7. 59,1 kg. Blutkalziumspiegel: 26. 6. 10,7 mg%; 3. 8. 11,0 mg%. Röntgenol.: Verwaschen konfl. fleckige Verschattung bds. Spitze der r. O. und l. O. und Mittelfeld. Beiderseits in den Oberfeldern auf Einschmelzung verdächtige Aufhellungen und Ringbildungen. Kn. confl. cav. Tbc., Emphysem.

Versuchz. — 15. 8. Lungenbefund: 19. 7. status idem; 8. 8. status idem. Beschwerden: 19. 7. Atemnot bei Anstrengung; 8. 8. Schmerzen zeitweise zwischen den Schultern, Atemnot bei Anstrengung, kein Husten mehr. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 4. 8. + 10. Temp.: 4. 7. bis 4. 8. 36,6—37; 5. 8. bis 15. 8. 36,6—36,8. Gewicht: 16. 7. 60,6 kg, 13. 8. 62,2 kg. Blutkalziumspiegel: 8. 8. 11,2; 15. 8. 11,7 mg%.

Nachb. — 3. 9. Lungenbefund: 29. 8. status idem; 3. 9. status idem. Beschwerden: 29. 8. Atemnot, Druckgefühl i. Rücken je nach Witterung; 3. 8. Außer Atemnot beschwerdefrei. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 30. 8. + 16. Temp.: 16. 8. bis 27. 8. 36,6—36,9; 28. 8. bis 3. 9. 36,7—37,0. Gewicht: 1. 9. 63 kg.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal 2 Tabletten Calc. lact. täglich.

Epikrise:

Es handelte sich um eine knotig confl. cav. Tbc. mit Emphysem.

In der Vorbeobachtungszeit keine Lungenveränderung, keine Besserung der Beschwerden, Temp. um 37,0, Senkung leicht beschleunigt. Gewichtszunahme um 2,8 kg.

In der Versuchszeit keine Lungenveränderung, keine Besserung der Beschwerden, Temperatur blieb unter 37°. Senkung wurde normal, weiterhin Gewichtszunahme.

In der Nachbeobachtungszeit keine Lungenveränderung, fast beschwerdefrei. Temp. unter 37,0°, Senkung wieder leicht beschleunigt, leichter Gewichtsgeinn.

Keinen sicheren Einfluß der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tbc., desgleichen auch nicht auf den Blutkalkspiegel. Der Versuch ist also als negativ zu werten.

Fall 14) P. F.

Eine Schwester 1927 an Lungentbc. gestorben. 1926 linksseitige Rippenfellentzündung. 1929 Beinbruch. Im letzten Winter Husten mit Auswurf, Gewichtsverlust. Stellte einen Antrag auf Kur.

Vorbeobacht. vom 8. 5. bis 31. 5. Lungenbefund: Beiderseits über der o. Lungenhälfte Schallverkürzung und unbestimmtes Atmen mit hauchender Ausatmung. Über den u. Lungenabschnitten Atmung rau und scharf. Beiderseits über den o. 2/3 der Lunge reichl. mittelblasiger und mittelfeucht klingender Katarrh, r. v. u. h. o. z. T. großblasig. 31. 5. Katarrh weniger geworden. Beschwerden: Geringer Husten; 31. 5. subj. Wohlbefinden, wenig Husten. Auswurf: 8. 5. — 50 ccm; 1. 6. — 30 ccm. Tbc.-Baz.: 9. 5. + 3; 30. 5. + 3. Blut: BKS. 9. 5. + 12. Temp.: 8. bis 15. 5. 36,6—37,1; 16. 5. bis 24. 5. 36,4—36,8; 25. 2. bis 31. 5. 36,5—36,9. Gewicht: 9. 5. 63,9 kg; 22. 5. 65,2 kg. Röntgenol.: Dichte Durchsetzung beider Lungenfelder an d. o. Hälfte mit kleinfleckigen, mäßig scharf abgesetzten Trübungen. Große verwachsene, fleckige Hili. Medialer Zwerchfellbuckel.

Versuchs. — 3. 7. 34. Lungenbefund: 21. 6. l. kein Katarrh mehr. Beschwerden: 21. 6. wenig Husten. Auswurf: 21. 6. — 25 ccm. Tbc.-Baz.: 28. 6. + 3. Blut: 18. 6. + 25; 3. 7. + 15. Temp.: 1. 6. bis 16. 6. 36,6—36,8; 17. 6. bis 28. 6. 36,6—36,1; 29. 6. bis 3. 7. 36,5—36,8. Gewicht: 4. 6. 66,6 kg; 2. 7. 67,0 kg. Blutkalziumspiegel: 26. 6. 10,8; 3. 7. 10,9 mg%.

Nachb. — 5. 8. Lungenbefund: 11. 7. status idem; 6. 8. idem. Beschwerden: 11. 7. wenig Husten; 31. 7. ab u. zu Husten; 6. 8. subj. gut, mäßig Husten. Auswurf: 11. 7. — 15 ccm; 6. 8. — 15 ccm. Tbc.-Baz.: 25. 7. + 3. Blut: 26. 7. + 17. Temp.: 6. 7. bis 30. 7. 36,6—37,0; 1. 8. bis 5. 8. 36,7—37,2. Gewicht: 4. 8. 68,4 kg.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium per os dreimal 2 Tabletten Calc. lact. täglich.

Epikrise.

Es handelte sich um ein klein-knotige und cav. Lungentbc. Stauungslunge mit exfudativem Charakter.

In der Vorbeobachtungszeit war der Lungenbefund und seine Beschwerden unverändert. Die anfangs etwas erhöhte Temperatur hielt sich später unter 37,0. Der Auswurf ging zurück. Leichte Gewichtszunahme. Gegen Ende der Vorbeobachtungszeit besserte sich der Katarrh.

In der Versuchszeit verschwand der Katarrh links ganz. Subj. Wohlbefinden. Temperatur unter 37,0. Die Senkung war anfangs hoch, sank aber später. Weiterhin Gewichtszunahme.

In der Nachbeobachtungszeit keine Änderung des Lungenbefundes und der Beschwerden. Leichte Zunahme der Senkung und des Gewichtes. Der Auswurf wurde geringer.

Keine Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tbc. und auch nicht auf den Blutkalkspiegel. Der Versuch ist als negativ zu beurteilen.

Fall 15) H. Z.

Mit 13 Jahren Lungen spitzenkatarrh. Weihnachten 1933 schwere Erkältung. Mitte Januar 1934 wieder Erkältung, dazu Lungen spitzenkatarrh. Anfang März Husten mit blutigem Auswurf, dazu Müdigkeitsgefühl.

Vorbeobacht. vom 15. 4. bis 3. 7. 1934. Lungenbefund: R. Lunge: Über der o. Hälfte Schallverk. mit leisem unbestimmten und rauhem Atmen. Mit mäßig mittelgroßbläfigen Geräuschen. L. Lunge: Schall im ganzen etwas kurz mit rauhem Atmen. 11. 5. status idem; 30. 5. status idem; 26. 6. status idem. Beschwerden: Geringer Auswurf, gutes Allgemeinbefinden; 11. 5. subj. ganz gut, kaum Husten, kein Nachtschweiß; 21. 6. wenig Husten, zeitweilig vorübergehendes Ziehen in der r. Seite. Auswurf: 19. 4. — 5 ccm; 21. 6. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 20. 4. + 2; 17. 5. + 1; 13. 6. + 1. Blut: BKS. 20. 4. + 33; 3. 7. + 19. Temp.: 19. 4. bis 31. 5. 36,8—36,9; 1. 6. bis 3. 7. 36,6—37,0. Gewicht: 20. 4. 62,6 kg; 21. 6. 71,6 kg. Blutkalziumspiegel: 18. 6. 11,1; 26. 6. 11,8 mg%. Röntgenol.: R. in den o. Lungenfeldhälften verwaschen-konfl. Trübungen, mitten im Oberfeld beginnender fünfmarkstückgroßer Ringschatten. Übrige Felder r. verstreute scharfbegrenzte Fleckchen. L. im Mittelfeld verwaschene und z. T. schärfer begrenzte Trübungen. R. knotig konfl. Tbc., L. knotige Tbc.

Versuchs. — 13. 8. Lungenbefund: 10. 7. Katarrh ist r. verschwunden; 31. 7. Wiederauftreten des Katarrhs. r. Beschwerden: 10. 7. mäßiger Husten, leicht belegte Zunge; 31. 7. subj. Wohlbefinden, zeitweilig Ziehen in d. r. Seite. Auswurf: 10. 7. — 10 ccm; 31. 7. — 15 ccm. Tbc.-Baz.: 11. 7. + 3; 6. 8. + 3. Blut: 6. 8. + 12. Temp.: 4. 7. bis 13. 8. 36,5—37,0. Gewicht: 5. 7. 72,3 kg; 31. 7. 73,0 kg. Blutkalziumspiegel: 8. 8. 12,6; 13. 8. 12,6 mg%.

Dachb. — 31. 8. Lungenbefund: 20. 8. status idem; 30. 8. status idem. Beschwerden: 20. 8. wenig Husten, subj. Wohlbefinden; 30. 8. dito. Auswurf: 20. 8. — 15 ccm; 30. 8. — 15 ccm. Tbc.-Baz.: 27. 8. + 3. Blut: 14. 8. + 12. Temp. 14. bis 31. 8. 36,5—37,0. Gewicht: 16. 8. 72,9 kg; 29. 8. 73,7 kg.

Er bekam in der Versuchszeit 18mal 10 ccm 10% Calc. Sandoz i. ven., dazu Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotiv-kav. Lungentbc. mit Exfudation.

In der Vorbeobachtungszeit keine Änderung des Lungenbefundes, der Beschwerden, des Auswurfes und der Bazillenzahl. Temp. unter 37°. Senkung ging etwas zurück. 9 kg Gewichtszunahme.

In der Versuchszeit Verschwinden und Wiederauftreten des rechtsseitigen Katarrhs. Keine Änderung der Auswurfsmenge, der Beschwerden. Ansteigende Bazillenzahl. Die Senkung wurde fast normal. Dazu leichter Gewichtsgewinn und leichtes Ansteigen des Blutkalkspiegels.

In der Nachbeobachtungszeit keine Wirkung des Kalziums auf den Lungenbefund, auf die Beschwerden. Temperatur, Auswurf, Bazillenzahl, Senkung und Gewicht blieben unverändert.

Keine Wirkung auf die Form und Stärke der Tuberkulose unter der Kalziumtherapie. Die Wirkung auf den Blutkalkspiegel ist im positiven Sinne zu beurteilen. Therapeutisch aber auch hier kein positives Ergebnis.

Fall 16) N. Sch.

1921 Blinddarmoperation. 1928 Unfall durch Fall auf den Hinterkopf. Seit Mitte 1933 Atemnot bei Anstrengung, nachts Husten, Auswurf und Nachtschweiß.

Vorbeobacht. vom 7. 6. bis 5. 7. 1934. Lungenbefund: Schallverk. bds. über dem o. Lungendrittel mit gemischt-rauhem Atmen und hauchender Ausatmung. L. reichlicher als rechts mittelfeuchter Katarrh. Über den übrigen Lungenabschnitten rauhes und scharfes Atmen. 27. 6. status idem. Beschwerden: Mäßiger Husten, Brustschmerzen, Rauschen im Kopf, Kurzatmigkeit nach Anstrengung. 27. 6. wenig Husten, kein Nachtschweiß, Herzklopfen. Auswurf: 7. 6. — 2 ccm; 27. 6. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 8. 6. + 3; 3. 7. + 3. Blut: BKS. 8. 6. + 12; 28. 6. + 17. Temp.: 7. 6. bis 29. 6. 36,6—37,1; 29. 6. bis 5. 7. 36,6—37,0. Gewicht: 8. 6. 80 kg; 2. 7. 83,4 kg. Blutkalziumspiegel: 28. 6. 9,8; 5. 7. 9,7 mg%. Röntgenol.: R. u. L. disseminierte kleine scharfbegrenzte Fleckchen. Links im Spitzengebiet mehrere unregelmäßige Aufhellungen inmitten verwaschener Trübungen. Zwerchfellhochstand rechts.

Verfuchs. — 11. 8. Lungenbefund: 18. 7. status idem; 8. 8. status idem. Beschwerden: 18. 7. Husten weniger geworden; 8. 8. subj. beschwerdefrei, morgens etwas Husten, kein Nachtschweiß. Auswurf: 18. 7. — 5 ccm; 8. 8. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 27. 7. + 3. Blut: 5. 7. + 12. Temp.: 6. 7. bis 11. 8. 36,6—37,1. Gewicht: 17. 7. 84,5 kg; 31. 7. 85,3 kg. Blutkalziumspiegel: 12. 8. 11,4 mg%.

Nachb. — 30. 8. Lungenbefund: 29. 8. leichte Besserung d. Katarrhs. Beschwerden: 29. 8. morgens Husten, subj. beschwerdefrei. Auswurf: 29. 8. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 23. 8. + 2. Blut: 14. 8. + 8. Temp.: 12. 8. bis 30. 8. 36,6—37,1. Gewicht: 27. 8. 87,5 kg.

Er bekam in der Verfuhszeit 16mal 10 ccm 10% Calc. Sandoz i. ven. dazu Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig klein-kav. Lungentbc. mit stärkerer Cirrhose neigung.

In der Vorbeobachtungszeit keine Änderung des Lungenbefundes. Der Nachtschweiß sowie der Husten besserten sich. Die Temperatur war um 37. Der Auswurf war sehr gering, die Senkung stieg etwas. Bazillenzahl ließ nach. Gewichtszunahme um 3,4 kg.

In der Versuchszeit keine Lungenveränderung, dagegen subjektives Nachlassen der Beschwerden. Die Senkung fiel, Auswurf sehr gering, Temperaturen um 37,0. Weiterhin Gewichtsgewinn. Die Bazillenzahl stieg an. Der Blutkalkspiegel stieg unter der Kalktherapie.

In der Nachbeobachtungszeit ließ der Katarrh etwas nach. Patient war beschwerdefrei, Temperatur um 37, Auswurf gering, die Senkung wurde normal, die Bazillenzahl fiel. Weiterhin Gewichtsgewinn um 2,5 kg.

Keine sichere Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tuberkulose. Die Wirkung auf den Blutkalkspiegel ist im positiven Sinne zu bewerten. Therapeutisch aber ein negativer Versuch.

Fall 17) K. H.

1932 Iritis. Im Februar 1934 Grippe mit Kopfschmerzen, Husten und Auswurf. Nach 8 Tagen entwickelte sich eine pleuritis exsudativa l. Ist nicht punktiert worden. Sieben Wochen gelegen. Anschließend Kurantrag.

Vorbeobacht. vom 7. 6. bis 4. 7. 1934. Lungenbefund: Über der l. Lunge v. o. n. u. zunehmende Schallverkürzung mit unbestimmtem Atmen, über dem o. Drittel Katarrh. L. h. aufgehobenes Atmen. R. Schallverkürzung über d. o. Drittel mit gemischt-rauhem Atmen und v. o. Rg., R. v. abwärts unscharfes Atmen, 26. 8. status idem. Beschwerden: Wenig Husten; 28. 6. geringer Husten, kein Nachtschweiß, Puls gut. Auswurf: Bei der Aufnahme wenig; 28. 6. bis 5 ccm. Tbc.-Baz.: 9. 6. + 3; 4. 7. + 3. Blut: BKS. 8. 6. + 57; 5. 7. + 37. Temp.: In den ersten 14 Tagen leicht subfebril; 20. 6. bis 4. 7. 36,6—37,0. Gewicht: 8. 6. 54,4 kg; 2. 7. 55,4 kg. Blutkalziumspiegel: 28. 6. 10,7; 4. 7. 9,8 mg%. Röntgenol.: R. im Spitzenfeld unscharf verwischene fleckige Trübungen. Im Ober- und Mittelfeld kleinste dießem. Fleckchen. Links Verschattung fast des ganzen Lungenfeldes. Infraclav. und medial Verdacht auf Einschmelzung, unten Schwarten Schatten.

Versuchs. — 12. 8. Lungenbefund: 19. 7. keine Veränderung des Lungenbefundes. 9. 8. dito. Beschwerden: 19. 7. kaum Husten; 9. 8. subj. Wohlbefinden. Ab und zu Husten. Auswurf: 19. 7. fast c; 9. 8. o. Tbc.-Baz.: 2. 8. + 1. Blut: 12. 8. + 54. Temp.: 5. 7. bis 24. 7. 36,6—37,2; 25. 7. bis 12. 8. 36,6—37,0. Gewicht: 17. 7. 55,1 kg; 2. 8. 55,1 kg. Blutkalziumspiegel: 13. 8. 12,1 mg%.

Nachb. — 4. 9. Lungenbefund: 29. 8. keine Veränderung d. Lungenbefundes. 5. 9. dito. Beschwerden: 29. 8. subj. Wohlbef.; 5. 9. Allgemeinzustand subj. gebessert, wenig Husten. Tbc.-Baz.: 24. 8. spärlich. Temp.: 13. bis 29. 8. 36,6—37,1; 30. 8. bis 31. 8. 37,0—38,0; 1. 9. 37,2—37,5; 2. 9. bis 4. 9. 36,7—36,1. Gewicht: 14. 8. 55 kg. 29. 8. 54,4 kg.

Er bekam in der Versuchszeit 14mal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. ven. dazu Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig-kav. Lungentbc. und Verschwinden des Exsudats.

In der Vorbeobachtungszeit keine Veränderung des Lungenbefundes und der Beschwerden. Die im Anfang subfebrile Temperatur wurde normal. Die Blutsenkung blieb erhöht, desgleichen die Bazillenzahl. Geringer Gewichtsgewinn.

In der Versuchszeit keine Veränderung des Lungenbefundes, subj. Wohlbefinden, Temp. um 37,0, kein Auswurf mehr, Bazillenzahl fiel, das Gewicht hielt sich konstant. Deutliches Steigen des Blutkalkspiegels.

In der Nachbeobachtungszeit keine Veränderung des Lungenbefundes, einmal starker Temperaturanstieg, Bazillenzahl spärlich, kein Auswurf mehr, Senkung stieg, wogegen das Gewicht fiel.

Keine Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und die Stärke der Lungentuberkulose. Der Blutkalkspiegel stieg unter der Kalktherapie. Therapeutisch aber kein Erfolg.

Fall 18) L. K.

Seit Kriegsende im Herbst und Winter viel Husten mit Auswurf. Gewichtsverlust. Im Frühjahr 1934 zum erstenmal positiver Bazillenbefund.

Vorbeobachtg. vom 3. 5. bis 3. 7. 1934. Lungenbefund: Beiderseits über dem oberen Lungendrittel Schallverkürzung mit unbestimmtem und rauhem Atmen und mäßigen Rg. L. h. über der Spitze Bronchialatmen mit amph. Beiklang. 13. 6. Schallverkürzung über v. o. r. Lungendrittel, über ganze v. l. u. beiden h. Lungenpartien, dazu unbestimmt und rauhes Atmen mit mittelblasigen Rg; 3. 7. dito. Beschwerden: 4. 5. viel Husten, Kurzatmigkeit nach Anstrengung; 16. 6. Husten ist weniger geworden, keine Kurzatmigkeit mehr. Auswurf: 25. 5. — 20 ccm; 13. 6. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 4. 5. + 3; 28. 6. + 2. Blut: BKS. 4. 5. + 49; 18. 6. + 22; 3. 7. + 32. Temp.: 3. 5. bis 3. 6. 36,5—36,7; 4. 6. bis 3. 7. 36,3—36,6. Gewicht: 4. 5. 54,5 kg; 2. 7. 60,5 kg. Blutkalziumspiegel: 26. 6. 11,2 mg%; 3. 7. 10,8 mg%. Röntgenol.: Am 4. 5. konfl. verwaschen-fleckige Verschattung der Spitzen-Oberfelder mit Verdacht auf Einschmelzungen.

Versuchs. — 27. 7. Lungenbefund: 24. 7. perkutorisch und auskultatorisch keine Veränderung des Lungenbefundes. Beschwerden: 4. 7. Husten nachgelassen. Wieder Atemnot. 24. 7. wenig Husten. Auswurf: 4. 7 — 20 ccm; 24. 7. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 25. 7. + 2. Blut: 27. 7. + 29. Temp.: 4. 7. bis 27. 7. 36,2—36,4. Gewicht: 16. 7. 62,3 kg; 28. 7. 63,2 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 7. 9,3 mg%.

Nachb. — 2. 8. Lungenbefund: 1. 8. perkutorisch und auskultatorisch keine Veränderung des Lungenbefundes. Beschwerden: 1. 8. subj. Wohlbef. Wenig Husten. Auswurf: 1. 8. 34 — 15 ccm. Temp.: — 2. 8. 36,2—36,4.

Er bekam in der Versuchszeit total 10 ccm 10%iges Calc. Sandoz i. ven. und Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig-konfluierende und kavernöse Lungentbc. mit Exsudation.

In der Vorbeobachtungszeit nahm die Stärke des Hustens ab. Die Temperatur fiel ein wenig. Die Zahl der Tuberkelbazillen sank, dsgl. die Senkungsbefleunigung. Gewichtsanstieg um 6 kg.

In der Versuchszeit weiter Besserung des Hustens, der Temperatur, Gewichtsanstieg um etwa 2 kg.

In der Nachbeobachtungszeit weiterhin allgemeine Besserung und Abnahme der Auswurfsmenge.

Keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und die Stärke der Lungentuberkulose. Auch kein Ansteigen des Blutkalkspiegels, Demnach ist der Versuch als negativ zu bewerten.

Fall 19) B. S.

Ein Bruder Lungenkrank. Als Kind Maern und Keuchhusten gehabt. 1932 Husten und Auswurf, darum Heilbehandlung in Honnef. Hustenreiz bestand weiter, dazu Druckgefühl in rechter Seite bis zur Schulter. Abmagerung.

Vorbeobacht. vom 2. 5. bis 7. 7. Lungenbefund: Über der o. Hälfte leichte Schallverkürzung mit unbestimmtem u. rauhem Atmen und spär. Rg. L. Lunge: Schallverkürzung mit leisem unbestimmten u. rauhem Atmen. Über den oberen Partien Rg. 4. 7. Katarhh r. v. u. h. lebhafter. Beschwerden: Starker Husten, leichter Nachtschweiß, Druckgefühl in r. Schulter. Magenbeschwerden nach dem Essen. 18. 5. status idem; 12. 6. kein Nachtschweiß mehr, beschwerdefrei. Auswurf: 3. 5. — 25 ccm; 4. 7. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 3. 5. +2; 25. 6. + 1. Blut: BKS. 3. 5. + 20; 12. 6. + 6; 5. 7. + 5. Temp.: 2 bis 16. 5. 36,6—37,0; 17. bis 21. 5. 37,0—38,0; 22. 5. 38,0—39,0; 23. 5. 37,0—38,0; 24. 5. bis 7. 7. 36,8—37,0. Gewicht: 3. 5. 62,7 kg; 2. 7. 70,5 kg. Blutkalziumspiegel: 22. 6. 11,0 mg%; 5. 7. 11,5 mg%. Röntg.: Am 2. 5. Cirrh.-cav. Tbc., ringartiger Schatten im linken Spitzen und r. Oberfeld. Verstreute schärfer begrenzte Fleckchen im r. Oberfeld, verwaschenere im l. Ober- und Mittelfeld.

Versuchz. — 26. 7. Lungenbefund: 24. 7. Katarrh ist etwas spärlicher geworden. Beschwerden: 24. 7. wenig Husten, Druckgefühl in r. Schulter. Auswurf: 24. 7. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 19. 7. + 1. Temp.: 8. bis 18. 7. 36,5—37,0; 16. bis 18. 7. 36,3—36,8; 19. bis 27. 7. 36,4—37. Gewicht: 16. 7. 71,7 kg.

Nachb. — 29. 7. Lungenbefund: 29. 7. status idem. Beschwerden: 27. 7. allgem. Abgeschlagenheit. Auswurf: 29. 7. bis 25 ccm. Temp.: 27. 29. 7. 36,5—36,8. Gewicht: 29. 7. 72 kg. Blutkalziumspiegel: 30. 7. 9,9 mg%.

Er bekam in der Versuchszeit 10 ccm 10%iges Calc. Sandoz i. ven. dazu Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich um eine fortschreitende cirrhotische kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Stärkerwerden des Katarrhs; die Beschwerden und der Nachtschweiß besserten sich. Temp. wechselte stark. Die Bazillenzahl ging um die Hälfte herab, der anfangs geringe Auswurf stieg gegen Ende wieder auf den Anfangswert. Die anfangs beschleunigte Senkung wurde normal. Gewichtsgewinn um 8 kg.

In der Versuchszeit ging der Katarrh zurück, sonst weiterhin Besserung unter leichtem Gewichtsanstieg. Der Blutkalkspiegel sank.

Die Nachbeobachtungszeit war zu kurz.

Eine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf den Katarrh ist vielleicht anzunehmen. Dagegen spricht aber, daß Senkung und Sputummenge sich schon vorher besserten. Deshalb auch hier keine sichere Wirkung des Kalziums. Auf den Blutkalkspiegel keine Wirkung. Demnach ein negativer Versuch.

Fall 20) A. N.

1933 Rippenfellentzündung r., danach in Denklingen für vier Wochen zur Kur. Ende des Jahres Erkältung, danach in Honnef drei Monate zur Kur. 1933 14 Tage bettlägerig mit Schmerzen in der l. Brustseite. Häufig erkältet. Seit etwa fünf Tagen Heiserkeit.

Vorbeobacht. vom 12. 6. bis 28. 7. 1934. Lungenbefund: Schallverk. r. über der ganzen Lunge. L. v. bis Basis, h. bis Mitte Schulterblatt. Über den oberen Partien beiderseits gemischt-rauhes Atmen u. mäßig mittelblasiges Rg. 6. 7. status idem; 26. 7. status idem. Beschwerden: 12. 6. l. v. zeitweise auch r. Brustschmerzen. Magenbeschwerden, leichte Atemnot, zeitweise Schmerzen in der Nierengegend. 6. 7. mäßiger Husten; 26. 7. Atemnot nach Anstrengung. Auswurf: 6. 7. — 20 ccm; 26. 7. — 20 ccm. Tbc.-Baz. 13. 6. + 3; 9. 7. + 3. Blut: BKS. 13. 6. + 47; 24. 7. + 45. Temp.: 12. 6. bis 21. 7. 36,6—37,0; 21. 7. bis 28. 7. 36,6—36,8. Gewicht: 13. 6. 65,1 kg; 13. 7. 67,9 kg. Blutkalziumspiegel: 27. 7. 12,6 mg%. Röntgenol.: Am 13. 6. verwachsen konfl. Schatten r. im Spitzengebiet. Infraclav. Verdacht auf Einschmelzung. L. im Oberfeld lateral Cavumverdacht. R. Zwerchfell feilt. angewachsen.

Versuchsz. — 1. 9. Lungenbefund: 14. 8. die Rg. sind weniger geworden; 1. 9. keine wesentliche Änderung. Beschwerden: 14. 8. Husten ist weniger geworden. Auswurf: 14. 8. — 15 ccm. Tbc.-Baz.: 3. 8. + 3. Blut: 29. 8. + 47. Temp.: 28. 7. bis 1. 9. 36,6—36,8; 12. bis 19. 8. 36,6—37,0. Gewicht: 30. 7. 70 kg; 27. 8. 71 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 8. 12,0 mg%.

Nachb. — 9. 9. Lungenbefund: 9. 9. Rg. wieder stärker geworden. Beschwerden: 3. 9. Magenschmerzen und wenig Husten; 10. 9. Druckschmerz im Epigastrium. Auswurf: 3. 9. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 3. 9. + 3. Temp. 2. bis 9. 9. 36,6—37,0. Gewicht: 8. 9. 70,8 kg.

Er bekam in der Versuchszeit 12mal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc. dazu Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich bei der Aufnahme um eine knotig kav. Lungenbc. mit Exsudation.

In der Vorbeobachtungszeit leichte Besserung der Beschwerden, die Senkung blieb konstant erhöht, Gewichtszunahme um 2,8 kg.

In der Versuchszeit nur leichter Gewichtsanstieg, leichte Besserung des Hustens, der Blutkalkspiegel sank.

In der Nachbeobachtungszeit Besserung des Hustens, leichter Gewichtsverlust. Die Magenbeschwerden treten wieder mehr in den Vordergrund.

Über der Lunge unter der Kalziumtherapie Besserung des Katarrhs; da aber die übrigen Kriterien unverändert geblieben sind, kann man den therapeutischen Erfolg wohl als zweifelhaft hinstellen. Der Blutkalkspiegel zeigte keine Zunahme.

Fall 21) K. H.

Dezember 1930 erstmalig erkrankt mit Husten, Auswurf und Nachtschweiß. Ein Jahr nicht gearbeitet, danach subjektiv beschwerdefrei bis auf Appetitmangel. Am 5. 4. 1934 erkrankte er mit Schmerzen rechts (Rippenfellreizung). Auf Drängen des Patienten Untersuchung in der Heilstätte Roßbach, von dort aus zur Kur nach Hohen-Honnef.

Vorbeobacht. vom 2. 6. bis 3. 8. 1934. Lungenbefund: R. über der o. Hälfte l. über dem o. Drittel verkürzter Klopfchall. Beiderseits über den o. Lungenpartien gem.-rauhes Atmen, Mittelblasig feuchter Katarrh beiderseits über der o. Lungenhälfte. 3. 8. status idem. Beschwerden: 21. 6. morgens Husten, unter dem Schulterblatt bds. Schmerzen, Brechneigung, müde, schlapp, appetitlos; 13. 7. Schluckschmerzen und Brechneigung; 23. 7. Schmerzen im Leib. Fraglicher Druckschmerz. 24. 7. Die Schmerzen sind nach l. gewandert. Leucocytose, läßt in der Nacht den Arzt holen, wegen heftiger Schmerzen in der Blinddarmgegend mit Erbrechen. Verlegung für drei Tage in die Chirurgische. Auswurf: 21. 6. — 5 ccm; 3. 8. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 22. 6. +3; 18. 7. + 1. Blut: BKS. 22. 6. + 22; 10. 7. + 8; 24. 7. + 11. Temp.: 21. 6. bis 3. 8. 36,6—36,9. Gewicht: 22. 6. 62,1 kg; 2. 8. 64 kg. Blutkalziumspiegel: 10. 7. 11,2 mg%; 24. 7. 11,8 mg%. Röntgenol.: In beiden Spitzen und Oberfeldern fleckige und strangige, beiderseits ring Schattenartige Zeichnung. Das linke Spitzenfeld ist im ganzen trüber, die Fleckzeichnung links ist verwischener und konfl. als rechts.

Versuchs. — 29. 8. Lungenbefund: 22. 8. perk. status idem, ausk. rauhes Atmen m. hauchender Ausatmung r. l. v. o. mittelbläsiges Rasseln und gemischt-rauhes Atmen. Beschwerden: 3. 8. morgens Husten, sonst keine Schmerzen; 22. 8. Brechreiz, wenig Husten. Auswurf: 22. 8. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 13. 8. + 2. Temp: 3. bis 29. 8. 36,6—36,9. Gewicht: 29. 8. 65,8 kg.

Nachb. — 18. 9. 18. 9. über beiden o. Hälften Schallverkürzung, dazu r. gem.-rauhes Atmen mit hauchender Ausatmung und l. dazu Rasseln. Beschwerden: 11. 9. wenig Husten, sonst keine Beschwerden; 18. 9. dito. Auswurf: 11. 9. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 11. 9. + 2. Blut: 17. 9. + 15. Temp.: 1. bis 18. 9. 36,4—37,0. Gewicht: 17. 9. 64,5 kg. Blutkalziumspiegel: 29. 8. 11,8 gm%.

Er bekam in der Versuchszeit 12mal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., dazu Calc. lact. per os 20,0 g.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotiv-kav. Lungentbc. mit feuchtem Katarrh über beiden o. Lungenhälften.

In der Vorbeobachtungszeit trat eine vorübergehende Blinddarmerregung auf, darum drei Tage in der Bonner Chirurgischen Klinik. Die Temperatur war unter 37°, Auswurf gering, die Senkung ging fast auf die Norm zurück, die Bazillenzahl fiel. Gewichtssteigerung um 1,9 kg.

In der Versuchszeit keine Schulterblattschmerzen mehr. Temperatur unter 37°. Auswurfsmenge unverändert, desgleichen Kalkspiegel, weiterhin Gewichtsanstieg.

Während der Nachbeobachtung außer Brechreiz keine Schmerzen mehr. Temperatur und Auswurf unverändert, desgl. Bazillenbestand. Langsames Steigen der Senkung und Fallen des Gewichtes.

Keine Wirkung der Kalziumtherapie auf die Art und Stärke der Tbc., auch nicht auf den Blutkalkspiegel. Der Versuch ist also als negativ zu bewerten.

Fall 22) J. A.

August 1932 Husten, Auswurf, Nachtschweiß, Mattigkeit und Blutspucken. Kur in Holsterhausen vom 3. 11. 32 bis 2. 2. 33. Nach der Kur zunächst Wohlfühl, dann auf Anraten des Arztes erneute Kur in Hohen-Honnef. Gute Erholung. Kommt jetzt zur Kurwiederholung.

Vorbeobacht. vom 22. 2 bis 2. 8 3. 1935. Lungenbefund: 22. 2. R. Lunge: Über der Spitze rauhes Atmen. L. Lunge: In ganzer Ausdehnung leichte Schallverkürzung mit rauhem Atmen. 15. 3. status idem. Beschwerden: 22. 2. mäßiger Schlaf; 15. 3. Allgemeinbefinden gut, Atemnot nach Anstrengung. Auswurf: 22. 2. — 2ccm. Tbc.-Baz.: 23. 2. + 1; 25. 2. keine mehr nachweisb.; Blut: BKS. 23. 2. + 8; 26. 3. + 6. Temp.: 22. 2. bis 28. 3. 36,6—36,9. Gewicht: 23. 2. 82,8 kg; 15. 3. 84,7 kg. Blutkalziumspiegel: 27. 3. 10,9 mg%.

Röntgenol.: Streifig-fleckig, Zeichnung des r. Oberfeldes. Scharfe Streifen mit Fleckchen im r. Spitzen- und Oberfeld. Verdacht auf Einschmelzung infraclav.

Versuchs. — 26. 4. Lungenbefund: 24. 4. keine Änderung d. Befundes. Beschwerden: 3. 4. gutes Allgemeinbefinden, beschwerdefrei; 24. 4. dito. Auswurf: 3. 4. — 2 ccm. Tbc.-Baz. keine mehr nachweisbar. Blut: BKS. 16. 4. + 8. Temp. 29. 3. bis 26. 4. 36,6 bis 36,8. Gewicht: 29. 3. 85,1 kg; 26. 4. 88,1 kg. Blutkalziumspiegel: 16. 4. 11,2; 27. 4. 11,1 mg%.

Nachb. — 21. 5. Lungenbefund: 15. 5. keine Änderung d. Befundes; 19. 5. r. über Spitze rauhes Atmen, links Schallverkürzung mit rauhem Atmen. Beschwerden: 13. 5. beschwerdefrei; 19. 5. leichte Atemnot nach Anstrengung. Auswurf: 13. 5. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: keine mehr nachweisbar. Blut: 16. 5. + 7. Temp.: 27. 4 bis 21. 5. 36,6—36,8. Gewicht: 18. 5. 90,3 kg.

Er bekam in der Versuchszeit einmal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc.

Epikrise.

Es handelte sich um ein cirrh. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit war Allgemeinbefinden gut außer leichten Atembeschwerden nach Anstrengung. Die Tbc.-Bazillen gingen auf 0 zurück. Senkung war normal. Gewichtszunahme um 1,9 kg.

In der Versuchszeit gutes Allgemeinbefinden, keine Atemnot mehr, Temperatur, Auswurf und Senkung unverändert. Weiterhin Gewichtszunahme (3 kg). Der Blutkalkspiegel stieg.

In der Nachbeobachtungszeit weiterhin Besserung, Zunahme des Gewichtes, Senkung und Temperatur blieben normal, wieder Atemnot beim Treppensteigen. Auswurf unverändert.

Die größere Gewichtszunahme ist nicht als Besserung zu werten, da die Wiegetermine nicht mit dem Beginn der therapeutischen Versuchsperiode übereinstimmen. Auf den Blutkalkspiegel leicht erhöhende Wirkung des Kalziums. Therapeutisch ist der Versuch aber als negativ zu bewerten.

Fall 23) W. A.

1914 Oberschenkelchuß. 1934 linksseitige trockene Rippenfellentzündung, danach noch weiterhin Stiche und Nachtschweiß behalten. In letzten Monaten dazu Gewichtsabnahme. Hat Kur beantragt.

Vorbeobacht. vom 6. 2. bis 20. 3. 1935. Lungenbefund: 6. 2. R. Lunge: An einzelnen Stellen rauhes Atmen. L. Lunge über dem oberen Drittel Schallverkürzung mit unbestimmten und rauhem Atmen. 19. 3. r. obere Drittel Schallverkürzung mit rauhem Atmen. Links: o. Drittel Schallverkürzung mit rauhem Atmen. Beschwerden: 6. 2. Atemnot nach Anstrengung; 1. 3. beschwerdefrei; 19. 3. dito. Auswurf: negativ. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: BKS. 7. 2. + 24; 12. 3. + 15.

Temp. 6. bis 26. 2. 36,6—36,9; 27. 2. bis 20. 3. 36,6—36,9. Gewicht: 7. 2. 64,8 kg; 15. 3. 69,1 kg. Blutkalziumspiegel: 13. 3. 9,7 mg%; 20. 3. 12,4 mg%. Röntgenol.: Am 7. 2. konfl. verwaschene Trübung medial im linken Oberfeld, dem hilus angrenzend und lateral infraclav. Unschärf gezeichnetes Zwerchfell links.

Versuchs. — 30. 4. Lungenbefund: 9. 4. perk.: status idem, ausk.: rauhes Bläschenatmen rechts, l. unbestimmtes Atmen; 29. 4. Atemgeräusch im ganzen leise. Beschwerden: 9. 4. gutes Allgemeinbefinden, leicht kurzatmig; 29. 4. leichter Husten. Auswurf: negativ. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 21. 3. + 11; 30. 4. + 10. Temp.: 28. 3. bis 30. 4. 36,6—36,8. Gewicht: 26. 4. 71,9 kg. Blutkalziumspiegel 30. 4. 11,6 mg%.

Nachb. — 14. 7. Lungenbefund: 30. 5. rauhes Atmen r. L. o. Schallverk. mit unbestimmtem Atmen; 14. 7. r. Spitze leichte Schallverkürzung. Über l. Spitze spärli. Rg. Beschwerden: 30. 5. Druck i. l. Brust; 11. 6. kurzatmig; 1. 7. beschwerdefrei; 15. 7. dito. Auswurf: negativ. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 11. 7. + 12. Temp.: 1. 5. bis 14. 7. 36,6—36,7. Gewicht: 10. 5. 72,8 kg; 13. 7. 76,2 kg. Röntgenol.: 6. 6. Film unverändert; 15. 7. Durchleuchtungsbefund deckt sich mit dem Filmbefund.

Er bekam in der Versuchszeit 10mal 10 ccm 20%iges Kalzium Sandoz i. musc.

Epikrise.

Es handelte sich um eine fibrös-knotige Lungentbc. mit Infiltration. Bronchialdrüsentbc.

In der Vorebeobachtungszeit wurde Patient beschwerdefrei. Die erhöhte Senkung ging etwas zurück. Gewichtszunahme um 4,3 kg.

In der Versuchszeit blieb der Patient weiterhin beschwerdefrei. Die Senkung fiel zur Norm. Gewichtszunahme um 2,5 kg. Leichter Husten.

In der Nachbeobachtungszeit Nachlassen des Hustens, weiterhin Gewichtszunahme um 4,3 kg. Er selbst war beschwerdefrei.

Keine sichtbare Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tuberkulose. Der an sich gutartige Prozeß wird offenbar nicht beeinflusst. Es ist fraglich, ob dieser Fall für einen therapeutischen Versuch geeignet war. Der stark schwankende Blutkalkspiegel stieg nicht unter Kalzium.

Fall 24) W. B.

Hat als Kind mit tbc. Kindern gespielt. 1931 Müdigkeit, acht bis zehn Tage Kopfschmerz. Keine Lungenbeschwerden. Ende 1931 Husten, Auswurf und Nachtschweiß. 1932 röntg. Tbc. festgestellt. Jetzt Kur.

Vorbeobacht. vom 5. 2. bis 21. 3. 1934. Lungenbefund: R. Lunge: Über dem oberen Drittel Schallverkürzung mit rauhem Atmen. Links: oben Schallverkürzung, unten feinblasige Geräusche; 31. 3. r.

Lunge status idem, l. u. feilt. feinblasige Geräusche. Beschwerden: Wenig Husten, beiderf. oben Stiche in der Brust; 28. 2. kein Husten, kein Nachtschweiß, subj. Wohlbefinden; 21. 3. zuweilen Sensationen in der Brust. Auswurf: 28. 2. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 6. 2. + 1; 4. 3. + 3. Blut: BKS. 6. 2. + 18; 12. 3. + 18. Temp.: 5. 2. bis 21. 3. 36,6—36,9. Gewicht: 6. 2. 58,6 kg; 11. 3. 65,2 kg. Blutkalziumspiegel: 13. 3. 10,7 mg%. Röntgenol.: Scharfbegrenzte Fleckschatten im r. Oberfell. Interlobärstreifen rechts, links und lateral. Mittelfeld verwaschene Fleckschatten. Verdacht auf kleinere Einschmelzung lateral im Mittelfeld und verdächtige Ringzeichnung im Unterfeld. Verwaschene Zwerchfellrippenwinkel links.

Versuchs. — 1. 5. Lungenbefund: 9. 4. keine Veränderung des Befindens. Beschwerden: 9. 4. keine Beschwerden. Auswurf: 1. 5. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 28. 3. + 2; 24. 4. + 1. Blut: 30. 4. + 12. Temp.: 22. 3. bis 1. 5. 36,6—37. Gewicht: 25. 3. 65,7 kg; 26. 4. 67,7 kg. Blutkalziumspiegel: 23. 3. 12,7 mg%; 1. 5. 13,6 mg%.

Nachb. — 28. 6. Lungenbefund: 21. 5. l. Lunge rauhes Atmen; 11. 6. l. Lunge h. Schallverkürzung; 28. 6. zur Chirurgie zur Phrenicusexhairese. Beschwerden: 21. 5. beschwerdefrei. Auswurf: 11. 6. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 20. 5. + 1; 26. 6. + 1. Blut: 27. 6. + 19. Temp.: 2. 5. bis 28. 6. 36,5—36,7. Gewicht: 7. 5. 69,2 kg; 17. 6. 71,1 kg.

Er bekam in der Versuchszeit 10mal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., gleichzeitig 4 Wochen lang tägl. 2mal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotiv kav. Lungentbc. mit Exfudation.

In der Vorbeobachtungszeit blieb der Lungenbefund unverändert. Außer vereinzelte Sensationen in der Brust keine Beschwerden. Temperatur unter 37,0, Auswurf gering, Tbcbazillenzahl stieg, die Senkung blieb konstant erhöht, Gewichtszunahme um 6,6 kg.

In der Versuchszeit war der Lungenbefund, der am Ende der Versuchszeit leider nicht kontrolliert wurde, unverändert. Keine Beschwerden mehr. Senkung wurde langsamer, die Bazillenzahl nahm ab. Weiterhin Gewichtszunahme und Ansteigen des Blutkalkspiegels.

In der Nachbeobachtungszeit Verschlechterung des Lungenbefundes. Subj. keine Beschwerden, die Senkung stieg wieder, Auswurf und Bazillenzahl unverändert, weiterhin Gewichtsgeinn.

Unter der Kalziumtherapie wohl Besserung der Senkung, da aber die übrigen Kriterien unverändert geblieben sind, kann man den therapeutischen Erfolg wohl als zweifelhaft hinstellen. Der Blutkalkspiegel stieg eindeutig unter der Kalktherapie.

Fall 25) A. H.

Außer einer Kriegsverletzung nie krank gewesen. Dezember vorigen Jahres erkrankte er plötzlich im Anschluß an eine Er-

kältung mit Husten, dazu einmal blutiger Auswurf. Positiver Sputumbefund. I. G. Farben beantragte eine Kur.

Vorbeobacht. vom 7. 2. bis 19. 3. 1934. Lungenbefund: R. Lunge: In ganzer Ausdehnung Schallverkürzung mit leisem rauhem Atmen und spärlicher Rg. L. Lunge an einzelnen Stelle rauhes Atmen im o. Drittel Schallverkürzung. 1. 3. status idem. Beschwerden: 7. 2. etwas kurzatmig, Kribbeln im r. Fuß und Bein; 1. 3. keine Beschwerden; 21. 3. dito. Auswurf: 7. 2. — 5 ccm; 1. 3. negativ. Tbc.-Baz.: 8. 2. negativ; 9. 2. + 2; 6. 3. + 1. Blut: BKS. 8. 2. + 67; 12. 3. + 36. Temp.: 7. 2. bis 19. 3. 36,6—36,8. Gewicht: 8. 2. 69,1 kg; 11. 3. 71,8 kg. Blutkalziumspiegel: 13. 3. 10,5 mg%. Röntgenol.: Rechts: Verwaschene-fleckige und grobsträngige Zeichnung in den oberen Lungenhälften; Ringschatten. Links: Reichlich kleinfleckige, scharfbegrenzte Flecken im Mittelfeld, lateral auch vereinzelte mittelgroße und verwaschene Trübungen. Im Mittelfeld scharfbegrenzter haselnußgroßer Schatten.

Versuchs. — 26. 4. Lungenbefund: 21. 3. keine Änderung d. Befundes; 10. 4. R. v. feinblasiges Rasseln zu hören, sonst status idem. Beschwerden: 10. 4. beschwerdefrei. Auswurf: negativ. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 21. 3. + 34. Temp.: 20. 3. bis 20. 4. 36,6—36,7; 21. 4. bis 26. 4. 36,2—36,8. Gewicht: 26. 3. 73,3 kg; 23. 4. 75,8 kg. Blutkalziumspiegel: 23. 3. 11,3 mg%; 28. 4. 12,3 mg%.

Nachb. — 8. 5. Lungenbefund: 8. 5. perk. status idem, ausk. r. rauhes Atmen mit feinbl. Rg. Beschwerden: 8. 5. beschwerdefrei. Auswurf: negativ. Tbc.-Baz.: negativ. Blut: 30. 4. + 30. Temp.: 27. 4. bis 8. 5. 36,2—36,8. Gewicht: 6. 5. 75,8 kg.

Er bekam in der Versuchszeit Kalzium Sandoz 10%iges romal 10 ccm i. musc. gleichzeitig vier Wochen lang täglich zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig-kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Besserung des Allgemeinbefindens. der Auswurf ging auf 0 zurück, vereinzelt Tuberkelbazillen, die Senkung nahm ab, war dennoch sehr erhöht. Gewichtszunahme um 2,7 kg.

In der Versuchszeit keine Beschwerden von seiten der Lunge, Tuberkelbazillen wurden negativ, die Senkung sank weiterhin, blieb aber dennoch erhöht. Gewichtszunahme um 4 kg. Der Blutkalkspiegel stieg unter der Kalkzufuhr.

In der Nachbeobachtungszeit weiterhin keine Beschwerden, Temperatur normal, kein Auswurf und keine Tuberkelbazillen, Senkung fiel langsam weiter. Gewicht blieb konstant.

Keine Änderung der Form und Stärke der Tuberkulose infolge der Kalziumtherapie; wohl aber Ansteigen des Blutkalkspiegels. Therapeutisch ist dieser Versuch als negativ zu bewerten.

Fall 26) F. S.

Eine Schwester an Lungentbc. gestorben, Vater ist lungenkrank. Ende November erkrankte Patient im Anschluß an eine Erkältung mit Husten, Auswurf, Nachtschweiß und starkem Gewichtsverlust. Anfang Dez. 1934 rechtsseitiger Pneu. Danach Besserung. Vertrauensarzt stellte Kurantrag. Letzte Pneunachfüllung am 28. 2. 1935.

Vorbeobacht. vom 19. 2. bis 27. 3. 1935. Lungenbefund: R. Lunge: kompletter, künstlicher Pneu mit Exsudat. L. Lunge: ohne Besonderheit. 20. 2. R. Lunge: Exsudat angewachsen. Beschwerden: 19. 2. etwas Husten, zeitweise Nachtschweiß. Beim Husten Schmerzen i. d. r. Brustseite. Kurzatmigkeit. 20. 2. kaum Husten, Patient fühlt sich gebessert. Auswurf: 19. 2. — 10 ccm; 20. 2. — 30 ccm. Tbc.-Baz.: 20. 2. +2; 11. 3. + 1. Blut: BKS. 20. 2. + 69; 26. 3. + 81. Temp.: 19. bis 27. 2. 37,0—37,6; 28. 2. bis 19. 3. 36,8—37,3; 20. bis 27. 3. 37,1—37,5. Gewicht: 20. 2. 61,3 kg; 25. 3. 62,8 kg. Blutkalziumspiegel: 23. 3. 12,0 mg%; 27. 3. 12,7 mg%. Röntgenol: Künstl. Pneu r. mit gutem Collaps und Exsudat in Höhe der 6. Rippe. Scharfe Begrenzung des Lungenstumpfes. L. großer Hilus mit Fleckschatten.

Versuchs. — 17. 5. Lungenbefund: 2. 4. kein Exsudat mehr. R. Lunge perk. Schallverkürzung; ausk. abgeschwächt, rauhes Atmen. Perc. 13. 5. Lunge gem. Atmen. R. Lunge: Schallverkürzung gem.-rauhes teilweise abgeschwächtes Atmen. Beschwerden: 2. 4. Husten hat nachgelassen. 23. 4. beschwerdefrei. Auswurf: 2. 4. — 10 ccm. 13. 5. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 5. 4. + 2; 16. 5. + 1. Blut: 30. 4. + 33; 16. 5. + 28. Temp.: 28. 3. bis 7. 5. 36,8—37,1; 7. bis 17. 5. 36,5—36,7. Gewicht: 9. 4. 64,4; 6. 5. 71,4. Blutkalziumspiegel: 1. 5. 14,6 mg%.

Nachb. — 19. 5. Lungenbefund: 20. 5. Links gem. Atmen. Rechts Schallverk., i. o. Drittel v. Brochialatmen mit amph. Klang. Beschwerden: 20. 5. beschwerdefrei. Auswurf: 20. 5. — 2 ccm. Temp.: 18. bis 19. 5. 36,5—36,7. Gewicht: 18. 5. 73,3 kg.

Er bekam in der Versuchszeit 16mal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., dazu vier Wochen lang täglich zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um kav. Lungentbc. mit Infiltrat und Exsudat, dazu Pneu rechts.

In der Vorbeobachtungszeit leichte Besserung des Allgemeinbefindens und des Hustens. Mit Tagen hohe Temperatur, fallen aber im weiteren Verlauf. Auswurfsmenge wechselte. Die Senkungsbeschleunigung nahm zu. Leichte Gewichtszunahme.

In der Versuchszeit wurde Patient beschwerdefrei. Die Temperatur blieb normal, der Auswurf ging auf ein Minimum zurück, die stark beschleunigte Senkung fiel, das Exsudat schwand, 7 kg Gewichtsgewinn, Steigerung des Blutkalkspiegels.

Die Nachbeobachtungszeit war zu kurz um Rückschlüsse daraus zu ziehen.

Senkung und Gewicht scheinen auf einen Erfolg der Kalziumtherapie hinzudeuten. Hier fehlt zu einer sicheren Beurteilung die Nachuntersuchungsperiode. Das Verschwinden des Exsudates kann wegen des mangelhaften klinischen Befundes nicht auf das Kalzium bezogen werden. Der Blutkalkspiegel stieg einwandfrei.

Fall 27) P. A.

1933 rheumatische Beschwerden und Ulcusverdacht. Oktober 1934 erkältete er sich, seitdem dauernd Husten, in der letzten Zeit dazu Auswurf mit Stichen in der Brust und Nachtschweiß, dabei starker Gewichtsverlust.

Vorbeobacht. vom 5. 2. bis 27. 3. 1935. Lungenbefund: 5. 2. Über der r. Lunge Schallverkürzung über d. Spitze, allgemein abgeschwächtes rauhes Atmen. Links Schallverkürzung über der ganzen Lunge. Unbestimmtes Atmen mit reichlichem mittelbäsig, zähfeuchtem Katarrh über der o. Lungenhälfte. 15. 2. bis 6. 3. Bronchopneumonie mit gleichzeitigem Erguß l. 19. 3. R. abgeschwächtes rauhes Atmen. L. ganze Lunge Dämpfung mit gemischtem Atmen, dazu vereinzelt Rg. Beschwerden: 5. 2. starker Husten, Nachtschweiß, linksseitige Bruststiche, mäßige Halschmerzen, kurzatmig, müde. 15. 2. Schüttelfrost; 16. 2. links starke Schmerzen, kurzatmig, Nasenflügelatmen. Auswurf: 5. 2. — 40 ccm; 17. 2. — 70 ccm; 30. 2. 20 ccm; 27. 3. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: + 3; 11. 3. + 2. Blut: 16. 2. BKS. + 35; Baso. 0,5, Eos. 1; Jugend. —; Stab. 30,5; Segm. 45,5; Lymph. 16,5; Mono. 5; 20. 2. —, —, 3, 27, 39; 25,5, 6; 12. 3. + 25, —, 1,5, 5,5, 16, 28, 41,5, 8. Temp.: 5. bis 13. 2. 36,8—37,4; 14. bis 26. 2. 38,4—39,2; 26. 2. bis 5. 3. 37,8—38,4; 6. bis 26. 3. 36,5—36,9. Gewicht: 6. 2. 60,6 kg; 25. 3. 62,6 kg. Blutkalziumspiegel: 23. 3. 14 mg%; 27. 3. 14,5 mg%. Röntg.: 6. 2. R. im Ober- und Spitzenfeld reichliche großfleckige zum Teil konfl. Trübungen. Im Spitzenfeld dreimal 3 cm große Ringe. Links neben der Herzspitze schleirige aus mittelgroßen begrenzten Fleckschatten bestehende Schattenpartien. 16. 2. klare Zeichnung des Ringschattens links oben. Infiltratschatten links. Herzzwerchfellwinkel vergrößert?

Verfuchs. — 25. 4. Lungenbefund: 26. 4. status idem. Beschwerden: 31. 3. noch immer zu Bett. Auswurf: 1. 4. — 20 ccm; 26. 4. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 5. 4. + 2. Blut: BKS. 25. 4. + 27. Temp.: 27. 3. bis 1. 4. 36,8—37,4; 2. bis 26. 4. 36,6—36,9. Gewicht: 7. 4. 61,8 kg; 24. 4. 63,9 kg.

Nachb. — 30. 4. Lungenbefund: 30. 4. status idem. Beschwerden: 27. 4. wechselndes Befinden. Auswurf: 27. 4. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 25. 4. + 3. Blut: 30. 4. + 20. Temp.: 27. bis 30. 4. 36,6—36,9. Gewicht: 27. 4. 63,5 kg. Blutkalziumspiegel: 1. 5. 12,2 mg%.

Er bekam in der Versuchszeit zehnmal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., gleichzeitig vier Wochen lang täglich eine Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig-kav. Lungentbc. mit exsudativem Charakter.

In der Vorbeobachtungszeit trat eine Bronchopneumonie auf mit Erguß auf der linken Seite. Anfangs hohe Temperaturen, Auswurfsmenge nahm ab, desgleichen die Senkung. Nach Abklingen der Bronchopneumonie Besserung seiner Beschwerden und Gewichtszunahme um 2 kg.

In der Versuchszeit weiter Abfallen der Temperatur, der Auswurfsmenge, der Beschwerden, leichtes Ansteigen der Senkung. Weiterhin Gewichtszunahme Keine Beschwerden mehr.

Die Nachbeobachtungszeit war zu kurz, um bewertet werden zu können.

Keine Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Tbc., demnach ein negativer Versuch. Die Wirkung auf den Blutkalkspiegel ist nicht verwertbar, da die Anfangswerte schon zu hoch lagen.

Fall 28) J. R.

Die Mutter ist an Lungentbc. gestorben. Er selbst hat öfters kleine Erkältungen gehabt. Als 15jähriger acht Wochen in Bad Rillingen gewesen. 1931 wurde bei ihm Lungentbc. festgestellt. November 1931 in Holsterhausen, wo er fünf Monate blieb, dort wurde zuerst links, später auch rechts ein Pneu angelegt. Alle 3—4 Wochen Nachfüllung. Außer Gewichtsverlust keine Beschwerden, kommt zur Kur.

Vorbeobacht. vom 28. 2. bis 26. 3. 1935. Lungenbefund: Beiderseits über dem o. Lungendrittel Schallverkürzung mit leisem unbest. u. rauhem Atmen und spärli. Rg. links v. 22. 3. Schallverkürzung über r. o. Lungendrittel mit rauhem u. scharfem Atmen. Links ganz Schallverkürzung mit rauhem Atmen unbestimmter Natur, dazu feinblasiges Rasseln. Beschwerden: 28. 2. Husten, Brustschmerzen, etwas kurzatmig. 22. 3. liegt acht Tagen auf der Halle. Husten hat nachgelassen. Seit drei Tagen Druck in rechter Magengegend u. Brechreiz. Appetit ist aber gut. 26. 3. Spaltung eines periprokt. Abszesses. Auswurf: 22. 3. — 15 ccm. Tbc.-Baz.: 1. 3. + 2. Blut: BKS. 1. 3. + 46; 26. 3. + 63. Gewicht: 1. 3. 53,8 kg; 25. 3. 56,2 kg. Blutkalziumspiegel: 23. 3. 11mg %. Röntgenol.: 28. 2. Verschleierung des Spitzen- und Oberfeldes r. mit schmalem Pn.-saum im Spitzenfeld und unscharfer Fleck- und Streifenzeichnung im Oberfeld. Rechts Teilpneu im Spitzen- und Oberfeld, abgekapseltes Exsudat im Mittelfeld. Verdrängung des Mittelschattens nach rechts.

Versuchs. — 24. 5. Lungenbefund: 11. 4. keine Änderung d. Befunde. 21. 5. Links kein Rasseln mehr. Beschwerden: 11. 4. Husten und zeitweise links Brustschmerzen. 2. 5. Husten hat nachgelassen. 21. 5. Husten gebessert, noch leichte Brustschmerzen. Auswurf: 2. 5. — 20 ccm. Tbc.-Baz.: 20. 5. + 1. Blut: 23. 5. % 41. Temp.: 27. 3. bis 24. 5. 36,5—36,8. Gewicht: 23. 4. 57,9 kg; 20. 5. 58,8 kg. Blutkalziumspiegel: 1. 5. 13,2 mg%.

Nachb. — 27. 5. 26. 5. l. Schallverk. mit Giemen u. Brummen. Beschwerden: Ab und zu Magenbeschwerden, Husten unverändert. Auswurf: 26. 5. — 15 ccm. Temp. 25. 2. bis 27. 5. 36,5—36,8. Gewicht: 25. 5. 58,6 kg.

Er bekam in der Versuchszeit zehnmal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc. gleichzeitig vier Wochen lang täglich zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine cirrh. kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Besserung seiner Beschwerden, der Husten ließ etwas nach. Temperatur normal. Die beschleunigte Senkung stieg weiter. Gewichtszunahme um 2,8 kg.

In der Versuchszeit Besserung des Hustens, Temperatur weiter normal. Auswurf fast unverändert. Zahl der Tuberkelbazillen ist weniger geworden, die Senkung ist gebessert, weiterhin Gewichtszunahme. Ansteigen des Blutkalziums unter der Kalktherapie.

In der Nachbeobachtungszeit allgemeine Besserung, Temperatur normal, leichte Gewichtszunahme. Die Nachbeobachtungszeit war zu kurz.

Trotz leichter Besserung der Senkung keine wesentliche Wirkung der Kalziumtherapie auf die Form und Stärke der Lungentbc., demnach kein therapeutischer Erfolg der Kalkzufuhr. Dagegen gutes Ansteigen des Blutkalkspiegels.

Fall 29) P. M.

Seit November 1934 Husten mit Auswurf, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Ende November Lungenentzündung, danach nicht mehr erholt.

Vorbeobacht. vom 21. 3. bis 10. 5. 1935. Lungenbefund: Schallverkürzung ü. d. g. r. u. o. Hälfte der l. Lunge. Beiderseits ü. d. o. Lungenhälfen r. mehr als l. gemischt rauhes Atmen. Rechts mit hauchender Ausatmung. Über den übrigen Partien abwärts sehr scharfes Atmen. Beiderseits hinten spärliche feinblasige Geräusche. 29. 4. status idem. Beschwerden: Abends Husten. 12. 4. Husten hat nachgelassen, keine besonderen Beschwerden. 29. 4. subj. Wohlbefinden. Nur bei schlechtem Wetter Husten. Auswurf: 12. 4. — 20 ccm; 29. 4. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 22. 3. + 1; 15. 4. + 2; 9. 5. + 3. Blut: BKS. 22. 3. + 54; 9. 5. + 33. Temp.: 22. 3. subferil; 23. bis 26. 3. 37,1—36,7; 27. 3. bis 10. 5. 36,5—36,7. Gewicht: 22. 3. 60,3 kg; 7. 5. 65,8 kg. Blut:

kalziumspiegel: 10. 5. 11,9 mg%. Röntgenol.: Knotig konfl. Trübung beiderseits in den Oberfeldern. Rechts Aufhellung.

Verfuchs. — 7. 6. Lungenbefund: 20. 5. keine Änderung des Befundes. Beschwerden: 20. 5. wenig Husten, subj. gut. Auswurf: 20. 5. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 5. 6. + 2. Temp.: 11. 5. bis 7. 6. 36,5 bis 36,7. Gewicht: 21. 5. 66,5 kg; 3. 6. 67,6 kg. Blutkalziumspiegel: 1. 6. 14,0 mg%.

Nachb. — 16. 6. Lungenbefund: 17. 6. status idem. Beschwerden: 11. 6. beschwerdfrei. Auswurf: 11. 6. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: —. Blut: 13. 6. + 38. Temp. 8. bis 16. 6. 36,5—36,7. Gewicht: 15. 6. 66,6 kg.

Er bekam in der Versuchszeit neunmal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., dazu vier Wochen täglich zweimal 1 Dragee Vingantol.

Epikrile.

Es handelte sich um eine knotig-konfl. und kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Besserung des Allgemeinbefindens sowie des Hustens, die anfangs subfebrile Temperatur ging zur Norm zurück. Der Auswurf ging leicht zurück, die Bazillenzahl stieg, die beschleunigte Senkung fiel leicht. Gewichtszunahme um 5,5 kg.

In der Versuchszeit blieb die Temperatur normal, die Auswurfsmenge wurde geringer, desgleichen die Bazillenzahl, weiterhin Gewichtszunahme. Ansteigen des Blutkalziumspiegels unter der Kalktherapie.

In der Nachbeobachtungszeit keine wesentlichen Veränderungen der Befunde.

Außer leichter Besserung der Auswurfsmenge kein therapeutischer Erfolg des Kalziums auf die Form und Stärke der Tuberkulose zu erkennen. Dagegen Ansteigen des Blutkalkspiegels.

Fall 30) J. D.

Ende Januar leichte Erkältung. Anfang Februar Husten mit geringem Auswurf. Röntg. wurde Lungentbc. festgestellt.

Vorbeobacht. vom 2. 4. bis 8. 5. 1935. Lungenbefund: Beiderseits über dem o. Lungendrittel Schallverkürzung mit unbestimmtem u. rauhem Atmen und spärlichen Rg. 25. 4. status idem. Beschwerden: 2. 4. Wenig Husten, kein Nachtschweiß. 26. 4. subj. Wohlbefinden, kein Husten mehr. Auswurf: 3. 4. — 2 ccm; 25. 4. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 3. 4. + 2; 29. 4. + 1. Blut: BKS. 3. 4. + 22; 30. 4. + 15. Temp.: 2. bis 6. 4. 36,2—36,6; 7. 4. bis 8. 5. 36,6—36,8. Gewicht: 3. 4. 65,4 kg; 6. 5. 68,7 kg. Blutkalziumspiegel: 1. 5. 11,6 mg%. Röntgenol.: 3. 4. 1935 beiderseits von Spitze bis zur Mitte fleckige unscharfe z. Teil konfl. Trübungen mit je einem Ringschatten im Oberfeld. Links eine stark verdächtige Aufhellung im zweiten IKR. von Mitte nach hinten verstreut feine, meist unscharf begrenzte Flecken.

Versuchs. — 7. 6. Lungenbefund: 15. 5. keine Veränderung d. Befundes. 4. 6. Katarrh etwas spärlicher. Beschwerden: 15. 5. subj. Wohlbefinden. 4. 6. Abends leichter Husten. Auswurf: 15. 5. — 2 ccm;

4. 6. 0 ccm. Tbc.-Baz.: 27. 5. + 1. Blut: 10. 5. + 22. Temp. 9. 5. bis 7. 6. 36,5—36,8. Gewicht: 21. 5. 69,0 kg; 4. 6. 68,8 kg. Blutkalziumspiegel: 1. 6. 12,4 mg%.

Nachb. — 30. 6. Lungenbefund: 24. 6. nur noch geringer Katarrh. 1. 7. K. verschwunden. Beschwerden: 24. 6. beschwerdefrei. Auswurf: 24. 6. — 2 ccm; 1. 7. 0 ccm Tbc.-Baz.: 24. 6. + 2. Blut: 18. 6. + 16; 27. 6. + 32. Temp. 8. 6. bis 30. 6. 36,6—36,9. Gewicht: 30. 6. 70,8 kg.

Er bekam in der Versuchszeit neunmal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., gleichzeitig vier Wochen lang täglich zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotiv-kav. Lungentbc. mit Exsudation.

In der Vorbeobachtungszeit keine Besserung des Lungenbefundes. Der Husten ließ nach, desgleichen die Bazillenzahl, und auch die beschleunigte Senkung. Der Auswurf war gering. Gewichtszunahme um 3,3 kg.

In der Versuchszeit Wenigerwerden des Katarrhs, Temperatur blieb unter 37,0. Auswurf der gleiche, leichtes Ansteigen der Senkung, desgleichen Ansteigen des Blutkalziumspiegels unter der Kalktherapie. Leichter Gewichtsverlust.

In der Nachbeobachtungszeit verschwand der Katarrh vollständig, keine Beschwerden mehr, kein Husten und kein Auswurf. Die Bazillenzahl stieg wieder, desgleichen die anfangs gefallene Senkung. Leichter Gewichtsgewinn.

Der Katarrh ging zwar unter der Kalziumtherapie zurück, ging aber auch nach Aussetzen der Kalkzufuhr weiterhin zurück. Demnach ist das Nachlassen des Katarrhs nicht der Kalkzufuhr zuzuschreiben, also kein therapeutischer Erfolg des Kalkes bei diesem Versuche. Der Blutkalkspiegel stieg einwandfrei unter der Kalkzufuhr.

Fall 31) P. A.

1928 drei Wochen lang Lungenkatarrh mit Fieber. Seit Herbst 1934 zunehmender Husten mit Auswurf, Gewichtsabnahme, Nachtschweiß. Stiche in der linken Brustseite.

Vorbeobacht. vom 26. 3. bis 2. 5. 1934. Lungenbefund: Schallverkürzung lks. v. über der ganzen Lunge. Lks. h. u. r. über dem o. Lungendrittel, bds. über dem o. Drittel gemischt-rauhes Atmen mit hauchender Ausatmung. R. v. o. spärliche feinbl. Rg. Lks. h. oben mäßig, v. bis reichlich feuchtklingende Geräusche. 18. 4. status idem. Beschwerden: 26. 3. wenig Husten, zeitweilig lks. Brustschmerzen. 18. 4. Allgemeinbefinden gut. Keine Beschwerden. Auswurf: 27. 3. — 2 ccm; 18. 4. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 27. 3. + 2; 30. 4. + 1. Blut: BKS. 27. 3. + 32; 30. 4. + 23. Temp. 26. 3. bis 2. 5. 36,5—37,0. Gewicht:

27. 3. 51,5 kg; 24. 4. 52,6 kg. Blutkalziumspiegel: 19. 4. 12 mg%. Röntgenol.: Am 27. 3. rechts: Mäßig scharf begrenzte Fleckchen im Spitzengebiet. Zwerchfell adhärent. Links: Verstreute reichlich kleinfleckige Trübungen, bef. auch medial im Unterfeld. Große Aufhellung im Spitzenoberfeld.

Versuchs. vom 3. 5. bis 5. 7. Lungenbefund: 7. 5. R. v. oben scharf kl. Atmen mit verlängerter Ausatmung. Keine Rg. mehr. 17. 7. Über linker Lunge Giemen und Brummen, sonst status idem. Beschwerden: 7. 5. status idem. 28. 5. Husten vorübergehend vermehrt. 17. 6. beschwerdefrei. Auswurf: 28. 5. — 2 ccm. Tbc-Baz.: 18. 6. + 1. Blut: 18. 6. + 17. Temp.: 3. 5. bis 5. 7. 36,6—37,0. Gewicht: 6. 5. 52,7 kg; 2. 7. 53,4 kg. Blutkalziumspiegel: 1. 6. 12,6 mg%.

Nachb. — 16. 7. Lungenbefund: 8. 7. nur mehr wenig Giemen. 15. 7. R. v. o. vereinz. Giemen. Lks. ü. d. o. Drittel v. u. h: o. Rg. Beschwerden: 8. 7. wenig Husten; 15. 7. beschwerdefrei. Auswurf: 15. 7. — 2 ccm. Tbc-Baz.: 12. 7. + 1. Blut: 12. 7. + 19. Temp.: 6. bis 15. 7. 36,6—37,0. Gewicht: 13. 7. 53,4 kg.

Er bekam in der Versuchszeit zwölfmal 10 ccm 10%iges Kalzium Sandoz i. musc., gleichzeitig vier Wochen lang tägl. zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig-kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Besserung der Beschwerden, Temperatur unter 37,0, wenig Auswurf, langsames Fallen der Senkung, leichte Gewichtszunahme.

In der Versuchszeit vorübergehend Husten, Auswurf und Temperatur unverändert, weiterhin Abfallen der Senkung, leichte Gewichtssteigerung. Leichtes Ansteigen des Blutkalziums unter der Kalk-Vigantoltherapie.

In der Nachbeobachtungszeit ist keine wesentliche Änderung in Bezug auf Allgemeinbefinden, Temperatur, Auswurf, Senkung und Gewicht eingetreten.

Da keine wesentliche Wirkung der Kalziumtherapie auf die Stärke und Form der Tuberkulose vorliegt, ist der Versuch als therapeutisch negativ zu bewerten. Die Wirkung auf den Blutkalkspiegel ist fraglich, da dieser Unterschied im Bereich der Schwan-
kungsgrenze liegt.

Fall 32) J. M.

Seit 1919 öfters wegen Husten in Behandlung. Oktober 1925 Blinddarmoperation. Wegen Lungentbc. 1926 zwei Monate in Hohen-Honnet. 1927 am Magenulcus behandelt. 1931 zwei Monate wieder in Hohen-Honnet wegen Lungentbc. 1934 acht-tägige Grippe gehabt, dadurch drei Wochen krank gefeiert. Okt. 1934 stellte der behandelnde Arzt Antrag auf eine neue Kur.

Vorbeobacht. vom 26. 2. bis 21. 3. 1935. Lungenbefund: Rechte Lunge in ganzer Ausdehnung Schallverkürzung mit leisem Atmen und vereinzelt mf. Rg. Linke Lunge: über der Spitze Schallverkürzung mit rauhem und scharfem Atmen und spärlichem Giemen. 21. 3. keine Rg. mehr, desgl. kein Giemen mehr. Beschwerden: Starker Husten, Nachtschweiß, manchmal Rückenschmerzen, appetitlos und heiser. 21. 3. Nachts starker Husten, subj. beschwerdefrei. Auswurf: 21. 3. — 60 ccm. Tbc.-Baz.: 27. 2. + 2. Blut: BKS. 27. 2. + 28; 21. 3. + 31. Temp.: 26. 2. bis 8. 3. 36,6—36,8; 9. 3. bis 21. 3. 36,6—37,2. Gewicht: 27. 2. 58,6 kg; 12. 3. 60,6 kg. Blutkalziumspiegel: 13. 3. 10,0 mg%. Röntgenol.: 27. 2. r. Spitzenfeld homogen, Ober- u. Mittelfeld fleckförmig scharf begrenzt durchsetzt. L. lateral im Mittelfeld unsichere Fleckchen. Tiefstehendes Zwerchfell, rechts adhärent, links verwachsen Zwerchfellrippenwinkel.

Versuchs. vom 21. 3. bis 26. 4. Lungenbefund: 11. 4. status idem. Beschwerden: 8. 4. Hautefflorescenz m. Juckreiz, beginnend auf d. Rücken v. kurzer Dauer. 11. 4. starker Husten. Auswurf: 11. 4. — 30 ccm. Tbc.-Baz.: 18. 4. + 2. Blut: 26. 4. + 14. Temp.: 22. bis 26. 3. 36,6—37,2; 27. 3. bis 28. 4. 36,4—36,8. Gewicht: 26. 3. 60,5 kg; 24. 4. 61,8 kg. Blutkalziumspiegel: 24. 3. 11,5 mg%; 16. 4. 12,6 mg%.

Nachb. — 24. 5. Lungenbefund: 26. 5. perk. status idem, ausk. r. o. unbestimmtes Atmen, dazu Giemen und Brummen. Beschwerden: 21. 5. subj. stets zufrieden. Viel Husten, Luftnot. Auswurf: 21. 5. — 30 ccm. Tbc.-Baz.: 15. 5. + 1. Blut: 23. 5. + 13. Temp.: 26. 4. bis 26. 5. 36,4—36,6. Gewicht: 7. 5. 63,3 kg; 25. 5. 65 kg.

Er bekam in der Versuchszeit 20%iges Kalzium Sandoz zehnmal 10 ccm i. musc., gleichzeitig täglich vier Wochen lang zweimal ein Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich bei der Aufnahme um eine fibrös-knotige und cirrh.-kay. Lungentbc. Pleuraschwarte rechts.

In der Vorbeobachtungszeit stieg die erhöhte Senkung. Auswurfsmenge blieb unverändert. Temperaturen leicht erhöht, geringe Gewichtszunahme.

In der Versuchszeit ging die Temperatur zur Norm zurück, die Auswurfsmenge fiel um die Hälfte, weiterhin Gewichtszunahme, der Nachtschweiß ging zurück, keine Beschwerden mehr. Der Blutkalziumspiegel stieg einwandfrei.

In der Nachbeobachtungszeit bleibt die Senkung und Temperatur sowie die Auswurfsmenge die gleiche. Weiterhin Gewichtszunahme.

Während der Kalziumtherapie leichte Besserung der Befunde. Der Versuch kann evt. als positiv bewertet werden. Der Blutkalkspiegel stieg einwandfrei unter der Kalk-Vigantoltherapie.

Fall 33) H. K.

Mit 6 Jahren Lungenentzündung und Rippenfellentzündung gehabt. Mit 15 Jahren acht Wochen zur Kur in Aprath wegen Erkrankung der Lunge. 1929 13 Wochen in der Heilstätte Holsterhausen wegen Lungenerkrankung. Danach bis November 1934 gearbeitet, wo er erkrankte mit Husten und Blutspucken.

Vorbeobacht. vom 6. 2. bis 20. 3. 1935. Lungenbefund: 6. 2. V. r. Dämpfung bis fünfte Rippe, mittelbl. bis feinbl. Rg., dazu unbestimmtes Atmen. V. l. Dämpfung bis dritte Rippe, mittelbl. Rg. H. r. Dämpfung bis 8. BWD. m. unbest. Atmen. H. l. Dämpfung bis 3. BWD., dazu mittelbl. bis feinbl. Rg. 1. 3. status idem. 30. 3. status idem. Beschwerden: 6. 2. morgens Husten, kein Appetit, sonst Wohlbefinden. 21. 3. kein Husten, keine Beschwerden. Auswurf: 1. 3. — 30 ccm. Tbc-Baz.: 8. 2. + 2. Blut: BKS. 8. 2. + 20; 12. 3. + 5. Temp.: 6. 2. bis 20. 3. 36,6—36,8. Gewicht: 8. 2. 62,9 kg; 13. 3. 64,3 kg. Blutkalziumspiegel: 13. 3. 9,9 mg%. Röntgenol.: 8. 2. Ringschatten in rechter Spitze, Wabenzeichnung im l. u. r. infracl. von o. u. h. abnehmend dichte Fleckung beiderseits, meist scharfer begrenzt bis auf die spitzen Oberfelder.

Versuchs. vom 20. 3. bis 15. 4. Lungenbefund: 10. 4. keine Rg. mehr. Beschwerden: 10. 4. beschwerdefrei. Auswurf: 10. 4. — 4 ccm. Tbc-Baz.: 1. 4. + 2; 12. 4. + 2. Blut: 30. 3. + 5. Temp.: 20. 3. bis 15. 4. 36,7—36,8. Gewicht: 26. 3. 66,8 kg; 8. 4. 66,8 kg. Blutkalziumspiegel: 15. 4. 12,0 mg%.

Nachb. — 18. 4. Lungenbefund: 17. 4. links Dämpfung bis zweite Rippe, sonst status idem. Beschwerden: 17. 4. subj. Wohlbefinden, morgens Husten, Auswurf: 15. 4. — 5 ccm. Blut: 16. 4. + 9. Temp.: 14. bis 18. 4. 36,7—36,8. Gewicht: 17. 4. 66,5 kg.

Er bekam in der Versuchszeit zehnmal 10 ccm 20%iges Kalzium Sandoz i. musc., gleichzeitig vier Wochen lang zweimal 1 Dragee Vigan-to täglich.

Epikrise.

Es handelte sich um eine fibrös-knotige und kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit keine wesentliche Besserung des Allgemeinzustandes festzustellen. Die Senkung wurde normal und das Gewicht nahm um 2,6 kg zu.

In der Versuchszeit ließ der Husten nach, die Auswurfsmenge ging zurück, die Senkung blieb normal. Das Gewicht blieb stehen. Der Blutkalkspiegel stieg.

In der Nachbeobachtungszeit trat wieder etwas Husten auf, die Senkung stieg etwas, weiter Gewichtsverlust. Die Nachbeobachtungszeit war zu kurz.

Während der Kalziumtherapie ging einwandfrei die Exsudation zurück, was sich an Husten und Auswurfsmenge bemerkbar machte. Dieser Versuch kann evtl. als positiv bewertet werden. Der Blutkalkspiegel stieg eindeutig während der Kalktherapie.

Fall 34) J. G.

1929 Betriebsunfall, dadurch r. Zeigefinger verloren. 1931 Appendektomie. Januar 1935 acht Tage grippekrank. Anfang März 1935 „Grippe“, beginnend mit Fieber und Husten. Acht Tage gelegen. Danach Arbeitsversuch, dabei Blutspucken.

Vorbeobacht. vom 7. 5. bis 18. 6. 1935. Lungebefund: Rechts über den o. zweiten Drittel verkürzter Klopffschall, unbestimmtes Atmen und hinten oben mittelfeuchter Katarrh. Links: Geringe Spitzenschallverkürzung mit rauhem Atmen und vereinzelt Rg. 18. 6. status idem. Beschwerden: 8. 6. Husten, müde, schlapp, appetitlos. 28. 5. völlig beschwerdefrei. Auswurf: 28. 5. — 5 ccm; 18. 6. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 9. 5. + 3; 6. 6. + 1. Blut: BKS. 8. 5. + 54; 18. 6. + 16. Temp.: 7. 5. bis 18. 6. 36,4—36,7. Gewicht: 8. 8. 64,5 kg; 17. 6. 68,2 kg. Blutkalziumspiegel: 21. 5. 13,4 mg%. Röntgenol.: Beiderseits fleckig-mäßig scharfbegrenzte Schatten im Spitzengebiet rechts mehr als links. Beiderseits Ringzeichnung. Links lateral im 2. IKR. größeren Fleckschatten. Beiderseits verstreut kleine kalkdichte Fleckchen.

Versuchs. vom 18. 6. bis 20. 7. Lungenbefund: 10. 7. keine Nebengeräusche mehr, sonst status idem. Beschwerden: 10. 7. beschwerdefrei. Auswurf: 10. 7. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 1. 7. + 1. Blut: 16. 8. + 8. Temp.: 18. 6. bis 20. 7. 36,5—36,8. Gewicht 2 16. 7. 70,3 kg. Blutkalziumspiegel: 17. 7. 12 mg%.

Nachb. — 6. 8. Lungenbefund: 5. 8. links o. mbl. u. mf. Geräusche, r. h. fbl. Ra. sonst status idem. Beschwerden: 5. 8. subj. Wohlbefinden. Auswurf: 5. 8. — 2 ccm. Tbc.-Baz. 1. 8. o. Blut: 1. 8. + 15. Temp.: 20. 7. bis 6. 8. 36,5—36,8. Gewicht: 3. 8. 71,5.

Er bekam in der Versuchszeit vier Wochen lang tägl. zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotiv-kleinkav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit ließ der Husten nach, die Beschwerden verschwanden, die Senkung sank. Gewichtszunahme um 3,7 kg.

In der Versuchszeit weiterhin keine Beschwerden, die Senkung sank weiter, das Gewicht stieg auch weiter. Kein Ansteigen des Blutkalkspiegels.

In der Nachbeobachtungszeit gutes Allgemeinbefinden, leichtes Ansteigen der Senkung und des Gewichtes.

Keine Wirkung der Vigantolverabreichung auf die Form und Stärke der Tbc., auch keine Wirkung auf den Blutkalkspiegel.

Fall 35) J. S.

Am 7. Januar 1935 an Grippe erkrankt, 3—4 Tage zu Bett gelegen. Am 1. März Pneu-anlage rechts.

Vorbeobacht. vom 2. 5. bis 19. 6. 1935. Lungenbefund: Schallverkürzung über ganzer r. Lunge mit unbestimmtem Atmen und reich., mbl., mf. und feuchtklingende Rg. Links Schallverkürzung über d. o. Lungendrittel. V. o. unbestimmte Atmung, h. o. leises scharfklingendes Atmen, l. v. mf. Katarrh., dgl. h. o. 13. 6. status idem. Beschwerden: 2. 5. starker Husten, Nachtschweiß. 24. 5. subj. Wohlbefinden. Morgens und abends Husten. 13. 6. beschwerdefrei. Auswurf: 24. 5. — 5 ccm; 16. 6. — 10 ccm. Tbc.-Baz.: 3. 5. + 2; 29. 5. + 2. Blut: BKS. 2. 5. + 91; 18. 6. + 32. Temp.: 2. bis 3. 5. 36,2—36,5; 4. 5. bis 18. 6. 36,6 bis 36,8. Gewicht: 3. 5. 50,1 kg; 3. 6. 55,4 kg; 17. 6. 55,9 kg. Blutkalziumspiegel: 19. 6. 12,1 mg%. Röntgenol.: Beiderseits im Spitzengebiet Ringzeichen. Rechts in der ob. Hälfte, links im ganzen Lungenfeld diessem. mäßig scharfbegrenzte Fleckchen, links etwas unschärfer begrenzt als rechts.

Verfuchs. v. 19. 6. bis 20. 7. Lungenbefund: 2. 7. kein Katarrh mehr über der Lunge. Beschwerden: 2. 7. mittelfarker Husten, Befinden gut. Auswurf: 2. 7. — 5 ccm. Tbc.-Baz.: 24. 6. + 2; 19. 7. + 2. Blut: 13. 7. + 38. Temp.: 19. 6. bis 20. 7. 36,6—36,8. Gewicht: 17. 7. 57,3 kg Blutkalziumspiegel: 17. 7. 9,8 mg%.

Nachb. 1. 8. 36. 36. Lungenbefund: 23. 7. über r. Lunge ibl. Rasseln, sonst status idem. Beschwerden: 23. 7. Wenig Husten; 31. 7. zeitweilig Brustschm. Auswurf: 31. 8. — 3 ccm. Blut: 27. 7. + 30. Temp.: 20. 7. bis 1. 8. 36,6—36,8. Gewicht: 29. 7. 57,6 kg.

Er bekam in der Versuchszeit vier Wochen lang tägl. zweimal 1 Dra-gée Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich um eine knotig-kav. Lungentbc.

In der Vorbeobachtungszeit Abnahme des Hustens und der beschleunigten Senkung. 5,3 kg Gewichtszunahme.

In der Versuchszeit blieb die Temperatur normal, die Senkung veränderte sich kaum, desgleichen auch das Allgemeinbefinden, Verschwinden des Katarrhs. Weiterhin Gewichtszunahme.

In der Nachbeobachtungszeit, die zu kurz war, kamen als neue Momente die Brustschmerzen hinzu, ferner trat der Katarrh wieder auf. Sonst keine wesentliche Änderung.

Das Verschwinden des Katarrhs fällt in die Versuchszeit, sonst aber keine wesentliche Änderung der Tuberkulose. Bei diesem Falle war leider die Nachbeobachtungszeit zu kurz, um zu einem regelrechten Ergebnis zu kommen. Der Blutkalkspiegel zeigte unter Vigantol eine fallende Tendenz.

Fall 36) H. T.

1927 Mandeloperation. 1933 Sturz beim Rodeln. Brustkontusion, nicht krank gefeiert. Anlässlich einer Reihenuntersuchung Feststellung der Lungentbc. Keine Beschwerden.

Vorbeobacht. vom 7. 5. bis 19. 6. 1935. Lungenbefund: Schallverkürzung beiderseits ü. d. o. 2. Drittel, lks. etwas weiter herabreichend als rechts, Atmung unbest. mit fein bis mbl. mt. klingenden Rg. Abwärts bds. rauhes und scharfes Atmen. 31. 5. rechts kein Katarrh mehr. Beschwerden: 8. 5. Ab und zu Brustbeklemmung. 31. 5. kaum Huiten, keine besondere Beschwerden. Auswurf: 31. 5. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 8. 5. 0; 3. 6. + 1. Blut: BKS. 8. 5. + 12; 18. 5. + 7. Temp.: 7. 5. bis 19. 6. 36,5—36,7. Gewicht: 8. 5. 62,3 kg; 17. 6. 66,6 kg. Blutkalziumspiegel: 19. 6. 12,8 mg%. Röntgenol.: Bandförmige fast homogene Verschattung des lk. Oberfeldes die sich gegen Mittelfeld und Spitze in mäßig scharfe Fleckchen auflöst. Rechte Spitze und erster IKR. mit scharfbegrenzten Flecken durchsetzt. Strengige Hiluszeichnung. Im 2. u. 3. IKR. mit Kalkschatten durchsetzte Infiltrate.

Versuchs. v. 20. 6. bis 20. 7. 22. 6. status idem; 11. 7. lks. keine Nebengeräusche mehr, sonst status idem Beschwerden: 21. 6. beschwerdefrei. Auswurf: 11. 7. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 28. 6. 0; 1. 7. + 1. Blut: 16. 7. + 11. Temp.: 20. 6. bis 20. 7. 36,4—36,8. Gewicht: 16. 7. 69,9 kg. Blutkalziumspiegel: 17. 7. 10,7 mg%.

Nachb. — 5. 8. Lungenbefund: 5. 8. Schallverk. bds. über o. Drittel, dazu abgeschwächt. rauhes Atmen ü. ganzer Lunge. Beschwerden: 5. 8. beschwerdefrei. Auswurf: 5. 8. — 2 ccm. Tbc.-Baz.: 26. 7. 0. Blut: 1. 8. + 14. Temp.: 20. 7. bis 5. 8. 36,4—36,6. Gewicht: 3. 8. 72 kg.

Er bekam in der Versuchszeit vier Wochen lag tägl. zweimal 1 Dragee Vigantol.

Epikrise.

Es handelte sich bei der Aufnahme um eine indurierende Infiltration der Lunge.

In der Vorbeobachtungszeit wurde Auswurf, Husten, Beschwerden und Senkung besser. Das Gewicht stieg um 3,3 kg. Die Anzahl der Tuberkelbazillen im Auswurf wechselte.

In der Versuchszeit weiterhin Besserung der Beschwerden, desgleichen Gewichtsanstieg, leichte Steigerung der Senkung. Fallen des Blutkalziumspiegels unter der Vigantolverabreichung.

In der Nachbeobachtungszeit weiterhin beschwerdefrei. Keine Tuberkelbazillen mehr im Auswurf, leichte Senkungssteigerung, weiterhin Ansteigen des Gewichtes.

Keine Wirkung der Vigantolverabreichung auf die Art und Stärke der Tuberkulose, desgleichen auch nicht auf den Blutkalziumspiegel.

Kurze Zusammenfassung meiner Versuche.

Gegebene Präparate	Veränderung des Blutkalkspiegels			Veränderung der Lungentuberkulose		
	Erhöhung	fragl.	keine	Besserung	fragl.	keine
Oraldin per os	1	2	7	—	1	9
Calc. lact. per os,	—	1	3	1	—	3
Calc. Sandoz i. ven. dazu Calc. lact. per os	3	—	2	—	—	5
Calc. Sandoz i. musc.	1	—	1	—	—	2
Calc. Sandoz i. musc. dazu Calc. lact. per os	—	—	2	—	1	1
Calc. Sandoz i. musc, dazu 2 mal tägl. 1 Dragee Vigantol	8	2	—	1	3	6
Vigantol per os 2 mal tägl. 1 Dragee	—	—	3	—	—	3
	13	5	18	2	5	29

Bei kritischer Wertung der oben mitgeteilten Krankengeschichten ergibt sich zwar bei einem hohen Prozentsatz der Fälle eine Besserung während der Kalziumapplikation, aber fast immer nur dann, wenn auch in der Vorbeobachtungszeit schon eine Besserung festgestellt werden konnte. In anderen Fällen, wo keine durch das Röntgenbild objektivierte Nachuntersuchung stattfand, ist ein Scheinerfolg nicht ausgeschlossen, sodaß auch diese Resultate, falls es sich um Besserung handelt, nicht verwertbar sind. Es wurden zwar bei vielen der eignen Beobachtungen keine Kontrollaufnahmen gemacht, was aber, da es sich ausschließlich um Fälle handelte, die sich schon vor der Behandlung besserten und dadurch deshalb schon von der Bewertung ausgeschlossen waren, belanglos ist. Daß unter der Kalziumtherapie die Exsudation mehr oder weniger resorbiert wird, wie Lehner, Chiari und Januschke durch grundlegende Versuche bewiesen, konnte auch ich an zwei meiner Fälle einwandfrei feststellen. Bei meinen fünf fraglichen Fällen nahmen zwar die katarrhalischen Erscheinungen ab, aber eine direkte Beeinflussung des tuberkulösen Prozesses konnte ich nicht feststellen.

Weiter zeigt sich, daß der Anstieg des Blutkalkspiegels nicht mit dem therapeutischen Erfolge parallel geht. So konnte z. B. bei fast allen Fällen die mit einer Kombination von Kalzium „Sandoz“ intramuskulär und Vigantol behandelt waren, der Kalkspiegel des Blutes erhöht werden, ohne daß in einem dieser Fälle ein therapeutischer Erfolg zu verzeichnen wäre. Andererseits blieb der Blutkalziumspiegel in den Fällen, wo unter der Kalziumbehandlung der Lungenbefund sich besserte, unverändert, was ein Beweis dafür ist, daß auch diese einzigen positiven Resultate wahrscheinlich nicht dem Kalziumspiegel zugeschrieben werden dürfen, und daß die günstige Wendung auch ohne Kalzium eingetreten wäre.

Zusammenfassend ließe sich also feststellen, daß sich weder durch intravenöse, intramuskuläre noch perorale Kalziumverabreichung ein länger anhaltender Anstieg des Blutkalziumspiegels erzielen läßt.

Der angeblich günstige Einfluß von Kalziumverabreichung bei der Tuberkulose konnte bei streng kritischer Wertung des erzielten Erfolges bisher nicht eindeutig bestätigt werden. Um die Wirkungsmöglichkeit des verabreichten Kalziums zu beurteilen, darf nicht die Veränderung des Blutkalziums als Maßstab gesetzt werden, sondern die Gesamtkalziumbilanz des Körpers. Eine experimentelle Grundlage für die Kalziumtherapie bei der Tuberkulose besteht also bisher noch nicht.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Martini und Herrn Chefarzt Dr. Schulte-Tigges zu danken für die Anregung zu der Arbeit und freundliche Unterstützung bei Anfertigung derselben. Ganz besonderen Dank schulde ich auch Herrn Dr. Schuler für die freundliche Unterstützung, sowie dem deutschen Tuberkulose-Forschungsinstitut für sein Entgegenkommen.

Literaturverzeichnis.

- Adlersberg: Wien. Med. Wschr. 1928, Nr. 7.
Barath: Ther. d. Gegenwart. 1932, H. 2.
Baucke: Dtsch. med. Wschr. 1934.
Billigheimer: Klin. Wschr. 1923, 1033.
Brumann: Arch. f. Klin. Med. 176.
Castellvi: Münch. med. Wschr. 1910.
Chiarri u. Januschke: Arch. f. exper. Path. 65, 120.
Delore: Betr. Klin. Tbs 88, 3.
Dirr: Münch. med. Wschr. 1934, Nr. 44.
Ebbecke: Arch. f. d. ges. Physiologie, 1922.
Eppinger u. Hess: Z. Klin. Med. 68, H. 3/4.
Greville: Study of the blood calcium.
Guth: Beitr. Klin. Tbc. 53, 94 55, 41.
Hammarsten: Zbl. Tbc. Forschg. 12, 49.
Hartwich: Z. f. Tbc. Bd. 37.
Hein: Klin. d. Tbc. 73, H. 5.
Heise: Die Med. Welt, 1935, Nr. 41.
Hoefch: Klin. Wschr. 1934, II.
Hoefch: Klin. Wschr. 1935, I.
Jacoby: Ther. Gegenwart, 1916, Nr. 5.
Kaewel: Z. Klin. Med. 100, 1.
Kaminski: Ztschr. f. Tbc. 59.
Kenner: Schweiz. Rundschau f. Med., Nr. 19, 142.
Kraus u. Zondek: Klin. Wschr. 1922, Nr. 36.
— Klin. Wschr. 1925, Nr. 26.
v. Kraus: Ther. Gegenwart, 1933, H. 3.
Lehner: Klin. Wschr. 1925, 2106.
Leitner: Fortschr. Ther. 11.
Linnekogel: Die Behandlung der Tbc. mit Calc.-Silicium.
Löwy: Ther. Gegenwart, 67, H. 1.
Maendl: Z. f. Tbc. 35.
Maendl: Med. Klin. 1920.
Mandl: Z. f. Tbc. 28.
Martini: Dt. Med. Wschr. 1932.

- Mattaufsch: Wien. Med. Wschr. Nr. 21.
 Matz: Ztschr. f. Tbc. Bd. 41.
 Matz: Ztbl. Tbc. Forfchg. 25.
 Ostroumova: Zeitschr. Tbc. Bd. 42.
 Pachon: Ztschr. Tbc. Bd. 65.
 Pinkhof: Ref. Zbl. Tbc. Forfchg. 25, 259.
 Pinkussen: Biochem. Z. 161, 61.
 Prest: Ref. Zbl. Tbc. Forfchg. 16, 191.
 Rehfeld: Prakt. Tbc.-Blätter Bd. V, H. 1.
 Rosen: Reg. Zbl. Tbc.-Forfchg. 25, 808.
 Rosen: Ztschr. f. Tbc. Bd. 42.
 Rosenow: Z. exper. Med. 4.
 Rothlin: Schweiz. Med. Wschr. 1927, 388.
 — Schweiz. Med. Wschr. 1928.
 — Ztschr. f. d. gef. exper. Med. Bd. 70, H. 5/6.
 Schierenberg: Dtsch. Med. Wschr. 1934, Nr. 13.
 Schloßmann: Klin. Wschr. 1925, 1263.
 Schulte-Tiggess: Zbl. f. gef. Tbc.-Forfchg. Bd. XIX.
 Senator: zit. nach Zbl. Tbc.-Forfchg.
 Starkenstein: Ther. Halbmn. 1921, 553.
 Steinberg: Beitr. Klin. Tbc. Bd. 82, 122.
 — Beitr. Klin. Tbc. Bd. 71, 137.
 Stuber: Klin. Wschr. 1922, Nr. 49/50.
 Undritz: Münch. Med. Wschr. 1931, Nr. 41, 1741.
 Voorhoeve: Dtsch. Arch. f. Klin. Med. 110.
 Wenzel: Arch. f. exper. Path. 137, 215.
 Zimmermann: Ärztl. Rdsch. 1928, Nr. 7.
 Zondek: Dtsch. Med. Wschr. 1921, 50.
 — Med. Klin. 1922, H. 48.
 — Biochem. Z. 132, 263.
 — Klin. Wschr. 1925, 905.

Lebenslauf.

Ich, Karl Vieweger, wurde am 9. Juni 1910 als Sohn des im Felde gebliebenen prakt. Arztes Karl Vieweger und seiner Ehefrau Johanna geb. Recht, in Derfchlag geboren. Von 1920 ab besuchte ich das Städt. Gymnasium in Bonn. Hier bestand ich Ostern 1930 die Reifeprüfung. Vom Sommer-Semester 1930 an studierte ich Medizin an der Universität Bonn, wo ich im Herbst 1935 das Staatsexamen ablegte.